

品質と収量の安定に欠かせない 健全な苗から収穫前までの常備薬！

野菜・畑作用殺虫剤

プルバンコ® フロアブル5

powered by
RYNAXYPYR®
ACTIVE INGREDIENT



ねぎ、ブロッコリー、レタス
さといも、とうもろこし、しょうが
「無人航空機による散布」
を追加

■適用害虫と使用方法

※1：セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5～4ℓ)当り0.5ℓ

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントラニリポールを含む農薬の総使用回数				
キャベツ	コナガ、アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ ネキリムシ類 カブラハバチ	100倍	※1	育苗期後半～定植当日	1回	灌注	4回以内 （定植時までの 処理は1回以内、 定植後の処理は 3回以内）				
	コナガ、アオムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ ウワバ類	500倍	苗地床1㎡当り2ℓ								
	コナガ、アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ ウワバ類 オオタバコガ	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布					
		20倍	1～2ℓ/10a			無人航空機 による散布					
はくさい	コナガ、アオムシ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ カブラハバチ	100倍	※1	育苗期後半～定植当日	1回	灌注					
	コナガ、アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ カブラハバチ	2000倍	100～300ℓ/10a		3回以内	散布					
		20倍	1～2ℓ/10a			無人航空機 による散布					
かぶ	コナガ	2000倍	100～300ℓ/10a		収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内			
非結球あぶらな科葉菜類 （タアサイ、ひろしまな、 なばな類を除く）				2回以内							
タアサイ				オオタバコガ		100倍	※1	育苗期後半～定植当日	1回	灌注	3回以内 （灌注は1回以内、 散布は2回以内）
ひろしまな				ハスモンヨトウ コナガ							
なばな類	アオムシ ハスモンヨトウ コナガ	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布					
	アオムシ	100倍	※1	育苗期後半～定植当日	1回	灌注					
アマランサス(茎葉)	シロオビノメイガ	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内				
だいこん	コナガ アオムシ ヨトウムシ				1回		4回以内 （灌注は1回以内、 散布は3回以内）				
はつかだいこん	ハイマダラノメイガ カブラハバチ ハモグリバエ類							1回			
カリフラワー	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ				100倍	※1	育苗期後半～定植当日	1回	灌注	4回以内 （定植時までの 処理は1回以内、 定植後の処理は 3回以内）	
ブロッコリー	コナガ、アオムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内 （定植時までの 処理は1回以内、 定植後の処理は 3回以内）				
		20倍	1～2ℓ/10a			無人航空機 による散布					
茎ブロッコリー	ハスモンヨトウ	2000倍	100～300ℓ/10a			育苗期後半～定植当日	1回	散布	4回以内 （灌注は1回以内、 散布は3回以内）		
		100倍	※1					灌注			
レタス	ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内 （定植時までの 処理は1回以内、 定植後の処理は 3回以内）				
		20倍	1～2ℓ/10a			無人航空機 による散布					
		ハモグリバエ類	1000～2000倍					100～300ℓ/10a	散布		
	ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ ハモグリバエ類 ネキリムシ類 ヒメフタテンヨコバイ	100倍	※1	育苗期後半～定植当日	1回	灌注					
非結球レタス	ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ ハモグリバエ類	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内 （灌注は1回以内、 散布は3回以内）				

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントラニリブロールを含む農薬の総使用回数	
トマト	ハモグリバエ類	1000～2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内 （定植時までの 処理は1回以内、 散布は3回以内）	
	オオタバコガ	2000倍						
		ハモグリバエ類	100倍	1株当たり25mℓ	育苗期後半～定植当日	1回		灌注
ミニトマト	ハモグリバエ類	200倍	1株当たり50mℓ					
	コナジラミ類	100倍	1株当たり25mℓ					
		200倍	1株当たり50mℓ					
	ハモグリバエ類 オオタバコガ	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内 （灌注は1回以内、 散布は3回以内）	
なす	ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 ネキリムシ類	100倍	1株当たり25mℓ	育苗期後半～定植当日	1回	灌注	3回以内 （定植時までの 処理は1回以内、 散布は2回以内）	
	ハモグリバエ類	200倍	1株当たり50mℓ					
		ハモグリバエ類	1000～2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内		散布
	ハスモンヨトウ	2000倍						
とうがらし類	オオタバコガ	1000～2000倍			3回以内		4回以内	
	ハスモンヨトウ コナジラミ類	100倍	1株当たり25mℓ	育苗期後半～定植当日	1回	灌注	（灌注は1回以内、 散布は3回以内）	
ピーマン	ハスモンヨトウ オオタバコガ	1000～2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内 （灌注は1回以内、 散布は2回以内）	
	ハスモンヨトウ コナジラミ類	100倍	1株当たり25mℓ	育苗期後半～定植当日	1回	灌注	4回以内 （定植時までの 処理は1回以内、 散布は3回以内）	
きゅうり	ハモグリバエ類	100～200倍	1株当たり50mℓ					
		200倍						
		1000～2000倍						
	ウリノメイガ	2000倍						
ズッキーニ	ハモグリバエ類	1000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	
メロン すいか	オオタバコガ ハモグリバエ類							
とうがん にかうり	ハスモンヨトウ							
いちご				2回以内		2回以内		
せり科葉菜類 （パセリを除く）	ヨトウムシ	2000倍		収穫7日前まで	1回	1回	2回以内 （灌注は1回以内、 散布は1回以内）	
パセリ	ヨトウムシ ハスモンヨトウ			収穫3日前まで	3回以内	無人航空機 による散布	4回以内 （灌注は1回以内、 定植後の処理は 3回以内）	
らっきょう	ハモグリバエ類						3回以内	
ねぎ	シロイチモジヨトウ ネギコガ ハモグリバエ類	20倍	1～2ℓ/10a	収穫3日前まで	3回以内	無人航空機 による散布	4回以内 （灌注は1回以内、 定植後の処理は 3回以内）	
	ハモグリバエ類	100倍	※1	育苗期後半～定植当日	1回	灌注		
豆類（種実、ただし、 だいず、あずき、 らっかせいを除く）	ハスモンヨトウ	4000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内	
だいず	オオタバコガ ハスモンヨトウ マメシンクイガ ウコンノメイガ					16～32倍		0.8ℓ/10a
	あずき	ハスモンヨトウ アズキノメイガ	4000倍			100～300ℓ/10a		散布
えだまめ	オオタバコガ ハスモンヨトウ マメシンクイガ ウコンノメイガ	16～32倍	0.8ℓ/10a	収穫3日前まで	3回以内	無人航空機 による散布	3回以内	
未成熟さざげ	ハスモンヨトウ	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで		3回以内		散布
未成熟そらまめ	ハモグリバエ類	1000～2000倍						
さやいんげん 実えんどう さやえんどう	ハスモンヨトウ ハモグリバエ類	2000倍						
やまのいも	ハスモンヨトウ ナガイモコガ	20倍	1～2ℓ/10a			無人航空機 による散布		
かんしょ	ハスモンヨトウ	2000～4000倍	100～300ℓ/10a			散布		
		16倍	0.8～1.6ℓ/10a			無人航空機 による散布		
	ナカジロシタバ	4000倍	100～300ℓ/10a			散布		

■適用害虫と使用方法(中面からの続き)

2022年1月26日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントラニプロールを含む農薬の総使用回数	
さといも	ハスモンヨトウ	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	
アスパラガス		20倍	1～2ℓ/10a			無人航空機による散布		
ほうれんそう	2000倍	100～300ℓ/10a	3回以内			散布		3回以内
モロヘイヤ エンサイ					2回以内		2回以内	
つるむらさき しそ科葉菜類 (えごま(葉)を除く)					3回以内		3回以内	
えごま(葉)、ふき			収穫3日前まで		2回以内		2回以内	
ふき(ふきのとう)			収穫120日前まで					
クレソン(土耕栽培)			コナガ		3回以内		3回以内	
ごま			オオタバコガ		2回以内		2回以内	
とうもろこし	アワノメイガ オオタバコガ ツマジロクサヨトウ	20倍	1～2ℓ/10a		3回以内	無人航空機による散布	3回以内	
しょうが	ハスモンヨトウ					2000倍		100～300ℓ/10a
オクラ	オオタバコガ ハスモンヨトウ	100～180ℓ/10a	発生初期					
たばこ	ヨトウムシ	100～300ℓ/10a	発生初期	4回以内	4回以内			
とうき	キアゲハ	100～300ℓ/10a	発生初期	4回以内	4回以内			

大型チョウ目害虫への
高い防除効果、
長期残効性

省力的な灌注処理を
可能にする根からの
高い吸収移行性

散布処理の効果を
裏付ける浸達性

適用作物、
有用昆虫への
高い安全性

【上手な処理方法】キャベツの場合



農林水産省登録：第22464号

有効成分：クロラントラニプリロール(通称：リナキシピル®)…5.0%

総合版

●ラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所には置かないでください。
●空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、環境に影響のないよう適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。 ●防除日誌を記帳しましょう。



丸和バイオケミカル株式会社

■本社／〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2
☎03-5296-2314 <http://www.mbc-g.co.jp>
お問い合わせ窓口／☎03-5962-9731(平日9:00～17:00祝祭日を除く)

■札幌／☎011-222-1285
■名古屋／☎052-951-7234
■福岡／☎092-714-7101

■仙台／☎022-261-1103
■大阪／☎06-6484-6850

製品情報は
こちらから→

