

ピンチショット[®] フロアブル

®は丸和バイオケミカル株式会社の登録商標です。

ビフェントリン水和剤

ビフェントリン (PRTR・2種) ……2.0%
水、界面活性剤等 ……98.0%



500ml × 12本入

合成ピレスロイド系

ジアミド系殺虫剤との
ローテーション防除に!!

ケラだけじゃもったいない!
スジキリヨトウにも!



スジキリヨトウ 幼虫

大面積 (フェアウェイ・ラフ) では経済的
(0.1~0.2ml/m²)

適用害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10アール当り 使用液量	使用量		使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ビフェントリンを含む 農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量				
芝	シバツトガ	1500倍	300ℓ	0.2ml/m ²	300ml/m ²	発生 初期	3回以内	散布	3回以内
		500倍	100ℓ		100ml/m ²				
	スジキリヨトウ	2000倍	200ℓ	0.1ml/m ²	200ml/m ²				
		1500倍	300ℓ	0.2ml/m ²	300ml/m ²				
		500倍	100ℓ	100ml/m ²					
	ケラ	500倍	500ℓ	1.0ml/m ²	500ml/m ²				

※ 本表では登録内容の一部を省略・追記して記載しています。

◆パンチショットフロアブルの特長

1 スジキリヨトウには低薬量でも高い効果! m^2 当たり0.1ml (2000倍希釈液の200ml散布)で十分な効果を発揮します。


2 殺虫効果は即効的! 合成ピレスロイド系で、即効的に効果が発現します。

3 効果の持続期間が長い! 本剤の有効成分は水溶解度が極めて小さく、土壌に極めて強く吸着される性質を有しています。また、合成ピレスロイド系統の薬剤の中でも分解が緩やかで、効果の持続性が長いことが特長です。

◆低薬量試験結果

スジキリヨトウ

試験場所：中国地区 A CC
処理日：2012年7月10日
調査日：2012年7月23日
品種：ノシバ
植栽様式：ラフ状
害虫発生状況：中発生（中齢幼虫）
区制：3反復



パンチショットの2000倍(薬量0.1ml/水量200ml/㎡)処理はスジキリヨトウ(中齢幼虫)に対し高い防除効果を示した。

⚠️効果・薬害等の注意

- 使用前によく振ってから使用してください。
- ミツバチに対する注意 ・巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
- ミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
- 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 蚕に長期間毒性があるので、付近に桑園がある所では使用をさけてください。
- 本剤の散布の際に着用していた衣服は養蚕作業に用いるものと区別してください。
- 収穫間際の散布は、花卉や葉に汚れを生ずる場合があるのでさけてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してください。使用方法等を厳守してください。特に初めて使用する場合は、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

⚠️安全使用上の注意

- 誤飲に注意してください。誤って飲み込んだ場合は吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。使用中に異常を感じた時は、直ちに医師の手当を受けてください。
- 散布時は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをし、衣服を換えてください。作業時の衣服などは他と分けて洗濯してください。
- かぶれやすい人は取り扱いに十分注意してください。
- 街路、公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせないでください。小児、人畜等に留意してください。
- 火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努めてください。
- 漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収してください。
- 移送取扱いは、ていねいに行ってください。

治療法 筋弛緩薬(メトカルバモール製剤等)の投与が有効です(動物実験で報告)。

魚毒性等 ●河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意してください(魚類・甲殻類)。
●散布器具・容器の洗浄水は河川等に流さないでください。また、空容器は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

保管 密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な所に保管してください。

使用量に合わせて薬液を調製し、使いきってください。
空容器は圃場などに放置せず、
3回以上水洗し、適切に処理してください。
洗浄水はタンクに入れてください。

●使用前にラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。

■お求めは…

■販売元 **MBC** 丸和バイオケミカル株式会社

ユニカス事業部

■本社 / 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2
TEL03-5296-2340
■札幌 / TEL011-222-2305 ■仙台 / TEL022-261-1319
■名古屋 / TEL052-951-7235 ■大阪 / TEL06-6484-7222
■福岡 / TEL092-712-8330 <https://www.mbc-g.co.jp>

お問い合わせ窓口 / TEL 03-5962-9731 (9時~17時 土日祝を除く)