

殺菌剤、その先へ・・・

日本芝、西洋芝(バーミューダグラス)にも・・・

芝生用/殺菌剤・植物成長調整剤

丸和 **レキシコン**[®]
Lexicon[®]

ピラクlostロビン…5.0% フルキサピロキサド…4.0% 規 格…1kg X 6袋入

詳細はWEBでも
 ご覧いただけます。



MBC 丸和バイオケミカル株式会社



人畜・環境への高い安全性

人畜毒性(製剤)：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

LD ₅₀ (ラット、経口)	300<♀≦2000mg/kg
LD ₅₀ (ラット、経皮)	♂♀>2000mg/kg

魚毒性(製剤)

コイ	LC ₅₀	0.63mg/ℓ(96時間)
オオミジンコ	EC ₅₀	0.287mg/ℓ(48時間)
緑藻	ErC ₅₀	10.9mg/ℓ(72時間)

適用病害・使用目的と使用方法

2023年4月19日現在の登録内容

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラクトロピンを 含む農薬の総使用回数	フルキサピロキサドを 含む農薬の総使用回数
西洋芝 (ベントグラス)	葉腐病(ブラウンパッチ) 赤焼病 ピシウム病 炭疽病 ダラースポット病 紅色雪腐病	100倍	100mℓ/m ²	発病前 ～ 発病初期	3回以内	散布	3回以内	4回以内
		200倍	200mℓ/m ²					
		500倍	500mℓ/m ²					
	フェアリーリング病	1000倍	1ℓ/m ²					
西洋芝 (パーミューダグラス)	ピシウム病 ダラースポット病 カーブラリア葉枯病 ネクロティックリングスポット病	100倍	100mℓ/m ²	発病前 ～ 発病初期	3回以内	散布	3回以内	4回以内
		200倍	200mℓ/m ²					
		500倍	500mℓ/m ²					
日本芝	ダラースポット病 カーブラリア葉枯病 葉腐病(ラージパッチ) 炭疽病 立枯病(ゾイシアデクライン) ネクロティックリングスポット病	100倍	100mℓ/m ²	発病前 ～ 発病初期				
		200倍	200mℓ/m ²					
		500倍	500mℓ/m ²					

作物名	使用目的	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラクトロピンを 含む農薬の総使用回数	フルキサピロキサドを 含む農薬の総使用回数
西洋芝 (ベントグラス)	根重の増加	100倍	100mℓ/m ²	芝生育期	3回以内	散布	3回以内	4回以内
		200倍	200mℓ/m ²					
		500倍	500mℓ/m ²					

※赤字は適用拡大内容

使用上の注意事項

⚠ 効果・葉害等の注意

- 散布液調製の際は、水をかきまぜながら本剤の所定量を徐々に加えてください。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用してください。
- 根重の増加を目的として散布する場合、高温時の根が衰退する時期にあわせて使用してください。
- 蚕に対して影響があるので付近に桑畑があるときはかからないように注意して散布してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

⚠ 安全使用上の注意

- 誤飲、誤食などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。

- 本剤は皮ふに対して刺激性があるので皮ふに付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。

- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをしてください。

- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

魚毒性等…水産動植物(魚類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空袋は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

保管…直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

- ラベルをよく読んでください。● 記載以外には使用しないでください。● 小児の手の届く所には置かないでください。

ユニカスは日本ジュニアgolfer育成協議会(JGC)を応援しています。

■お求めは

■販売

MBC 丸和バイオケミカル株式会社

ユニカス 事業部

■東京/〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2
TEL:03-5296-2340 <https://www.mbc-g.co.jp>

■札幌/TEL:011-222-2305 ■仙台/TEL:022-261-1319

■名古屋/TEL:052-951-7235 ■大阪/TEL:06-6484-7222

■福岡/TEL:092-712-8330

お問い合わせ窓口/TEL:03-5962-9731(9時~17時 土日祝を除く)