農林水産省登録　第22895号

丸和

クロックス®

®は丸和バイオケミカル株式会社の登録商標です。

ねぎの生育期全面散布*で使用できるようになりました!

*登録内容、注意事項をご確認ください。

2018年 丸和バイオケミカル㈱ 阿見開発センター　●定植：6月14日　●散布：9月6日　●使用薬量：100g/10a　●優占草種：スベリヒユ

スベリヒユ

シロザ

ハコベ

ゴウシュウアリタソウ

写真の雑草は散布適期ではありません。雑草が大きくなりすぎないうちに適期散布を心がけましょう。

●適用雑草と使用方法　「ねぎ」の登録のみ抜粋。赤字が適用拡大部分

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール当り使用量		本剤の使用回数	使用方法	リニュロンを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
ねぎ（露地栽培）	一年生雑草	定植後 但し、収穫30日前まで （雑草発生前）	100～150g	70～150ℓ	1回	畦間土壌散布	1回
	一年生広葉雑草	定植30日後以降 中耕培土後 但し、収穫30日前まで （雑草発生揃期）	75～150g	100ℓ		雑草茎葉散布 又は全面散布	

2018年12月５日拡大

MBC 丸和バイオケミカル株式会社

注意 ねぎでの使用方法について

1 処理方法と使用可能時期



※定植～収穫まで60日以下の作型（**いわゆる葉ねぎ等**）や、中耕培土をしない作型での**全面散布**はできません。

2 混用について

他の農薬とは混ぜないでください。

3 近接散布について

他の農薬を散布した後、7日以上間隔をあけてください。

7日間以上あける

4 ノズルについて

除草剤用ノズルを使って均一に散布してください。



注意事項（抜粋）

●ねぎの雑草茎葉散布又は全面散布で使用する場合、展着剤との混用及び７日以内の近接散布は薬害を生じることがあるのでさけてください。
●生育の進んだ雑草には効果が劣る場合があるので、時期を失しないように散布してください。
●砂質で水はけのよい畑では薬量を控えめにしてください。激しい降雨が予想されるときには使用をさけてください。また、砂土では使用しないでください。
●マルチ栽培、トンネル栽培等での使用は薬害を生じるおそれがあるので、さけてください。

〈その他、使用上のポイント〉
●過湿などにより生育状況の悪い時での使用は薬害を生じるおそれがあるので、さけてください。
●生育したイネ科雑草に対しては効果が劣るので、必要に応じてイネ科雑草に有効な茎葉処理剤を併用してください。

●ラベルを良く読む　●記載以外には使用しない　●小児の手の届く所には置かない

※空袋は圃場などに放置せず適切に処理する。

■お求めは…

■販売元 MBC 丸和バイオケミカル株式会社
■本　社／〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2 TEL03-5296-2314
■札　幌／TEL011-222-1285　■仙　台／TEL022-261-1103
■名古屋／TEL052-951-7234　■大　阪／TEL06-6484-6850
■福　岡／TEL092-714-7101
https://www.mbc-g.co.jp
お問い合わせ窓口／TEL 03-5962-9731（9時～17時 土日祝を除く）