

丸和

# エコトップ<sup>®</sup>P 乳剤

大豆・飼料用とうもろこし用除草剤

イヌタデ

イヌビエ

イヌビユ

スベリヒユ

タカサブロウ

ハコベ

メヒシバ

カヤツリグサ

イネ科雑草  
広葉雑草に

効く!

# 大豆・飼料用とうもろこし用除草剤

丸和

# エコトップ P 乳剤

種類名：ジメテナミドP・リニュロン乳剤  
 有効成分：ジメテナミドP…8.5% / リニュロン(PRTR-1種)…12.0%  
 毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）  
 危険物表示：第2石油類危険等級Ⅲ  
 包装：500ml×20 / 5ℓ×2

## 広範囲の畑地一年生雑草に高い効果

ジメテナミドPとリニュロンの2種混合により、イネ科・広葉の広範囲の一年生雑草には種後出芽前（雑草発生前）処理で高い除草効果を示します。

## 安定した除草効果

エコトップの効果は土壌の種類、気象条件に左右されることが少なく、安定した除草効果を発揮します。

## 適用作物に対する選択性が高い

土壌吸着性が高く、しかも土壌表層に安定した薬剤処理層を形成するので、は種後出芽前処理で使用できます。



## 使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	10アール当り使用量		本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ジメテナミド及びジメテナミドPを含む農薬の総使用回数	リニュロンを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量					
だいず	一年生雑草	は種後出芽前（雑草発生前）	全土壌（砂土を除く）	400~600ml	100ℓ	1回	全面土壌散布	全域	1回	2回以内（全面土壌散布は1回以内、雑草茎葉兼土壌散布は1回以内）
飼料用とうもろこし										1回

## 注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 本剤の所要量を所定量の水にうすめて、よくかき混ぜてから散布してください。
- 発芽後の雑草に対しては効果が劣るので、雑草発生前に時期を失しないように散布してください。
- 散布直後の多量の降雨は薬害を生じる恐れがあるので、天候を見極めてから散布してください。
- 砕土、整地はていねいに行い、種子が露出しないように覆土はできるだけていねいに行い、覆土深を2~3cm以上としてください。
- マルチ栽培、トンネル栽培等での使用は、薬害を生じるおそれがあるのでさけてください。
- 隣接作物にかかると薬害を生じるので、散布液がかからないよう注意して散布してください。特に風の強い時の使用はさけてください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 本剤は自動車、壁などの塗装面、大理石、御影石に散布液がかかると変色する恐れがあるので、散布液がかからないよう注意してください。
- 散布に使った器具類はよく水洗いして、他の用途に使用する場合は影響のないように注意してください。
- 誤飲などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 原液は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護メガネを

- 着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに十分に水洗い、眼科医の手当を受けてください。
- 原液は皮膚に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には不浸透性手袋を着用して薬剤が皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗顔・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 火災時は、適切な保護具を着用し消火剤等で消火に努めてください。
- 漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収してください。
- 移送取扱いは、ていねいに行ってください。
- 危険物第四類第2石油類に属するので火気には十分注意してください。
- 魚毒性等：使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 保管：火気や直射日光をさけ、食品と区別して、低温な場所に密栓して保管してください。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。 ● ラベルの記載以外には使用しないでください。 ● 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

● お求めは

販売元 **MBC** 丸和バイオケミカル株式会社

- 本社 / 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2 TEL03-5296-2314
  - 札幌 / TEL011-222-1285 ■ 仙台 / TEL022-261-1103
  - 名古屋 / TEL052-951-7234 ■ 大阪 / TEL06-6484-6850
  - 福岡 / TEL092-714-7101
- <https://www.mbc-g.co.jp>

お問い合わせ窓口 / TEL 03-5962-9731 (9時~17時 土日祝を除く)