

【適用病害と使用方法】

作物名	適用病害名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用方法	オキシテトラサイクリン を含む農薬の 総使用回数	ストレプトマイシン を含む農薬の 総使用回数
りんご	枝枯細菌病	2000 倍	200～700 ℓ/10a	収穫 60 日 前まで	3 回 以内	散布	3 回以内	3 回以内
なし				収穫 75 日 前まで				
もも	せん孔細菌病	1500 倍		収穫 60 日 前まで	2 回 以内		5 回以内	2 回以内
うめ	かいよう病	1000 倍		収穫 90 日 前まで			4 回以内	
すもも	黒斑病	1500 倍		収穫 30 日 前まで			3 回以内	
キウイ フルーツ	かいよう病 花腐細菌病	1000 倍		落花期 まで				
ばれいしょ	疫病		100～300 ℓ/10a	収穫 3 日 前まで	5 回 以内	5～10 秒間 種いも浸漬 種いも散布	5 回以内 (種いもへの 処理は 1 回以内)	5 回以内 (種いもへの 処理は 1 回以内)
	軟腐病	1000～ 1600 倍						
		黒あし病 そうか病	40～ 100 倍	— 種いも 100kg 当り 2.5～3ℓ	植付前			
キャベツ	黒腐病 黒斑細菌病	2000 倍	100～300 ℓ/10a	収穫 14 日 前まで	2 回 以内	散布	2 回以内	2 回以内
はくさい	軟腐病 黒斑細菌病	1500～ 3000 倍			3 回 以内		4 回以内	3 回以内
レタス	腐敗病	2000 倍			2 回 以内		2 回以内	2 回以内
たまねぎ	軟腐病	1000 倍		収穫 7 日 前まで	5 回 以内		5 回以内	5 回以内
にんにく	春腐病				3 回 以内		3 回以内	3 回以内
こんにゃく	葉枯病 腐敗病			250～ 500 倍	—		収穫 30 日 前まで	6 回 以内
	腐敗病	植付前	—			1 時間 種いも浸漬		
ほおずき	斑点細菌病	1000 倍	100～300 ℓ/10a	発病初期	3 回 以内	散布	3 回以内	4 回以内
シクラメン	葉腐細菌病		200～300 mℓ/鉢	葉組み時 鉢上げ時 又は 鉢替え時	8 回 以内 (※)		土壌灌注	8 回以内

※：但し土壌灌注は 4 回以内

作物名	適用病害名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用方法	オキシテトラサイクリン を含む農薬の 総使用回数	ストレプトマイシン を含む農薬の 総使用回数
たばこ	野火病 角斑病	1500 倍	100～180 ℓ/10a	収穫 3 日 前まで	2 回 以内	散布	2 回以内	—
	吊り腐れ (空洞病菌 による) 空洞病	1000～ 1500 倍						
	疫病	1000 倍						
桑	縮葉細菌病	500 倍	200～700 ℓ/10a	—	3 回 以内		3 回以内	
西洋芝 (ベントグラス) (生産圃場)	かさ枯病		0.5ℓ/㎡	発病前～ 発病初期	8 回 以内		8 回以内	

