

【適用害虫と使用方法】

作物名	適用害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用方法	シアントラニプロール を含む農薬の 総使用回数
りんご	アブラムシ類	2500 倍	200～700 ℓ/10a	収穫前日 まで	3 回 以内	散布	3 回以内
	ハマキムシ類 シンクイムシ類 ヒメボクトウ キンモンホソガ ギンモンハモグリガ ケムシ類 ヨモギエダシャク オオタバコガ コガネムシ類 ヨトウムシ	2500～ 5000 倍					
もも ネクタリン	ハマキムシ類 ケムシ類 コガネムシ類	5000 倍					
	モモハモグリガ シンクイムシ類	2500～ 5000 倍					
	モモチョッキリゾウムシ	2500 倍					
なし	ハマキムシ類 シンクイムシ類 ヒメボクトウ	2500～ 5000 倍					
	ケムシ類	5000 倍					
	アブラムシ類	2500 倍					
ハマキムシ類 ケムシ類 オウトウショウジョウバエ アザミウマ類 コスカシバ コガネムシ類							
小粒核果類 (うめ、すもも を除く)	ケムシ類	2500～ 5000 倍					
うめ	ケムシ類 モモヒメヨコバイ						
すもも	シンクイムシ類 ケムシ類 スモモミハバチ						
ぶどう	ハスモンヨトウ	5000 倍					
	ケムシ類 アザミウマ類 コガネムシ類 クビアカスカシバ フタテンヒメヨコバイ						
	コガネムシ類 ケムシ類	100 倍	4～14 ℓ/10a		無人航空機 による散布		
マンゴー	アザミウマ類	2000 倍	200～700 ℓ/10a	収穫 7 日 前まで	2 回 以内	散布	2 回以内

作物名	適用害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用方法	シアントラニリプロール を含む農薬の 総使用回数
かんきつ	アザミウマ類 アゲハ類 ミカンハモグリガ ミカンキジラミ ケムシ類 ハマキムシ類 ヨモギエダシャク ケシキスイ類 ゴマダラカミキリ成虫 チャノミドリヒメヨコバイ コアオハナムグリ ハスモンヨトウ カネタタキ ミカンナガタムシ クワノミハムシ	5000 倍	200～700 ℓ/10a	収穫前日 まで	3 回 以内	散布	3 回以内
		100 倍	4～12 ℓ/10a	開花期 まで		無人航空機 による散布	
かんきつ (苗木)	ミカンハモグリガ アゲハ類 ゴマダラカミキリ成虫 アブラムシ類		30～500 ml/樹 (但し、 130ℓ/10a まで)	育苗期	3 回 以内	散布	3 回以内
ブルーベリー	アブラムシ類 オウトウショウジョウバエ ケムシ類	2500倍 5000倍	200～700 ℓ/10a	収穫 前日まで			
いちじく	アザミウマ類	2500倍		収穫 14 日 前まで	2 回 以内		2 回以内
茶	ヨモギエダシャク チャハマキ チャノコカクモンハマキ チャノホソガ チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ マダラカサハラハムシ ハスモンヨトウ コミカンアブラムシ	2000 倍	200～400 ℓ/10a	摘採 7 日 前まで	1 回		1 回

