

【適用雑草と使用方法】

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	チフェンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
小麦	—	一年生広葉雑草	春播栽培の 小麦 3～5 葉期	3～5 g/10a	通常散布 50～100ℓ/10a 少量散布 25～50ℓ/10a	1 回	雑草茎葉 散布又は 全面散布	1 回
		ギシギシ類	秋播栽培の 幼穂形成期 但し、収穫 45 日前まで					
		一年生広葉雑草 スズメノテッポウ	は種後～節間伸長前	5～10 g/10a				
		一年生広葉雑草	節間伸長開始期～ 穂ばらみ期 但し、収穫 45 日前まで	3～10 g/10a				
		カズノコグサ	麦 1 葉期～節間伸長前	10g/10a				
大麦		一年生広葉雑草 スズメノテッポウ	は種後～節間伸長前	5～10 g/10a				
牧草	牧野、 草地	一年生広葉雑草 ギシギシ類	採草 21 日前まで （雑草生育期）	3～5 g/10a	通常散布 50～100ℓ/10a 少量散布 10～50ℓ/10a			
			新播草地定着後 但し、採草 21 日前まで	0.5～1 g/10a				
飼料用 とうも ろこし	—	ギシギシ類	耕起 7 日前まで （雑草生育期）	2～4 g/10a	通常散布 50～100ℓ/10a 少量散布 25～50ℓ/10a			
			飼料用とうもろこし 2～4 葉期 （雑草生育期）	2g/10a				