

【適用雑草と使用方法】

作物名	適用 場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の 使用 回数	使用方法	DCMU を 含む農薬の 総使用回数		
				薬量	希釈水量					
だいず	—	一年生雑草	は種後出芽前	70～100 g/10a	70～100 ℓ/10a	1 回	全面土壌散布	2 回以内 (出芽前は 1 回以内、 生育期は 1 回以内)		
みかん			雑草生育期 但し、収穫 60 日 前まで	200～400 g/10a	100～200 ℓ/10a		雑草茎葉散布	1 回		
パイナップル			植付直後 (雑草発生前)	150～200 g/10a			全面土壌散布			
さとうきび (春植又は 夏植)			植付後萌芽前 (雑草発生前)	100～150 g/10a				100 ℓ/10a	2 回 以内	雑草茎葉散布
さとうきび (株出)		一年生及び 多年生 広葉雑草	雑草生育期 但し、収穫 90 日 前まで							
		一年生雑草	萌芽前 (雑草発生前)		1 回	全面土壌散布				
		一年生及び 多年生 広葉雑草	雑草生育期 但し、収穫 90 日 前まで		2 回 以内	雑草茎葉散布				
飼料用 さとうきび (春植又は 夏植)		一年生雑草	植付覆土後 (雑草発生前)	1 回	全面土壌散布	雑草茎葉散布	1 回			
		一年生及び 多年生 広葉雑草	雑草生育期 但し、収穫 90 日 前まで							
飼料用 さとうきび (株出)		一年生雑草	萌芽前 (雑草発生前)					雑草茎葉散布		
		一年生及び 多年生 広葉雑草	雑草生育期 但し、収穫 90 日 前まで							

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	DCMUを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
水田作物 (水田畦畔)	水田 畦畔	一年生雑草	雑草発生前	150～300 g/10a	25～300 ℓ/10a	1 回	全面土壌散布	1 回
			雑草発生始期 ～発生揃期		70～100 ℓ/10a		雑草茎葉散布 又は 全面土壌散布	
樹木等	公園 庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 のり面 鉄道等		雑草発生前	200～2000 g/10a	25～200 ℓ/10a	3 回 以内	植栽地を除く 樹木等の 周辺地に 全面土壌散布	3 回以内
		コケ類	コケ類生育期	200～400 g/10a	25～100 ℓ/10a		植栽地を除く 樹木等の 周辺地に	
		イシクラゲ	イシクラゲ 生育期				雑草茎葉散布 又は 全面土壌散布	

