

【適用病害・使用目的と使用方法】

作物名	適用病害名	希釈 倍数	使用 液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用 方法	ピラクロストロビン を含む農薬の 総使用回数	フルキサピロキサド を含む農薬の 総使用回数
西洋芝 (ベントグラス)	葉腐病(ブラウンパッチ) 赤焼病 ピシウム病 炭疽病 ダラースポット病 紅色雪腐病	100 倍	100 ml/m ²	発病前 ～ 発病初期	3 回 以内	散布	3 回以内	4 回以内
		200 倍	200 ml/m ²					
		500 倍	500 ml/m ²					
	雪腐小粒菌核病	100 倍	100 ml/m ²	根雪前				
		200 倍	200 ml/m ²					
		500 倍	500 ml/m ²					
	フェアリーリング病	500 倍	500 ml/m ²					
		1000 倍	1 ℓ/m ²					
	西洋芝 (バーミューダ グラス)	ピシウム病 ダラースポット病 カーブラリア葉枯病 ネクロティックリングスポット病	100 倍	100 ml/m ²				
200 倍			200 ml/m ²					
500 倍			500 ml/m ²					
日本芝	ダラースポット病 カーブラリア葉枯病 葉腐病(ラージパッチ) 炭疽病 立枯病(ゾイシアデクライン) ネクロティックリングスポット病	100 倍	100 ml/m ²					
		200 倍	200 ml/m ²					
		500 倍	500 ml/m ²					

作物名	使用目的	希釈 倍数	使用 液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用 方法	ピラクロストロビン を含む農薬の 総使用回数	フルキサピロキサド を含む農薬の 総使用回数
西洋芝 (ベントグラス)	根重の増加	100 倍	100 mℓ/m ²	芝生育期	3 回 以内	散布	3 回以内	4 回以内
		200 倍	200 mℓ/m ²					
		500 倍	500 mℓ/m ²					

