

【適用雑草と使用方法】

| 作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 使用量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | リニュロンを含む農薬の総使用回数 |
|--------------|-------|---------------------------|---------------|---------|--------|--|
| 小麦 (秋播栽培) | 一年生雑草 | は種後～発芽前 (雑草発生前) | 6kg/10a | 1回 | 全面土壌散布 | 1回 |
| だいず | | は種後出芽前 (雑草発生前) | 5～6 kg/10a | | | 2回以内 (全面土壌散布は 1回以内、雑草茎葉兼 土壌散布は1回以内) |
| らっかせい | | は種直後 (雑草発生前) | | | | 1回 |
| かんしょ | | 挿苗直 (雑草発生前) | | | | 2回以内 (全面土壌散布は 1回以内、雑草茎葉兼 土壌散布は1回以内) |
| こんにやく | | 植付直後 又は培土直後 (雑草発生前) | | | | 1回 |
| やまのいも | | 植付直後 (雑草発生前) | 6kg/10a | | | 2回以内 (粒剤は1回以内) |
| にんじん | | は種直後 (雑草発生前) | 4～6 kg/10a | | | 2回以内 (は種直後は1回以内、 にんじん3葉期以降は 1回以内) |
| 桑 | | 4～10月 (雑草発生前) | 6～8 kg/10a | | | 1回 |

