殺菌剤

マイコシールド®

農林水産省登録　第 16152 号

2025 年 3 月 10 日現在

【適用病害と使用方法】

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用方法	使用方法	オキシテトラサイクリンを含む農薬の総使用回数
もも	せん孔細菌病	1500～3000 倍	200～700 ℓ/10a	収穫 21 日前まで	5 回以内	散布	5 回以内
ネクタリン		1500 倍		収穫 28 日前まで			
すもも	黒斑病	2000 倍		収穫 21 日前まで	3 回以内		3 回以内
おうとう	樹脂細菌病	1500 倍		収穫 7 日前まで	2 回以内		2 回以内
うめ	かいよう病	1500 倍		収穫 21 日前まで	4 回以内		4 回以内
あんず		1500～3000 倍		収穫 14 日前まで	2 回以内		2 回以内
かんきつ（みかんを除く）		1000 倍		収穫 30 日前まで			
みかん				収穫 60 日前まで			
だいこん	軟腐病	750～1000 倍	100～300 ℓ/10a	収穫 14 日前まで	3 回以内		3 回以内
きゅうり	斑点細菌病	1500 倍	―	は種前	1 回	1～2 時間種子浸漬	1 回
トマト	かいよう病	1000～2000 倍	100～300 ℓ/10a	収穫開始 7 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内
ブロッコリー	花蕾腐敗病 軟腐病 黒腐病			収穫 14 日前まで			
キャベツ	黒腐病			収穫 7 日前まで			
ばれいしょ	軟腐病	1000 倍		収穫 21 日前まで	5 回以内		5 回以内（種いもへの処理は 1 回以内）
樹木類	枝枯細菌病		200～700 ℓ/10a	新梢伸長期～発病初期			5 回以内

®は日本曹達(株)の登録商標
ご使用の際は必ず製品ラベルをご確認ください