

【適用害虫と使用方法】

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロナトリプロールを含む農薬の総使用回数	
キャベツ	コナガ ハイマダラノメイガ アオムシ	セル成型育苗トレイ 1 箱またはペーパー ポット 1 冊(約 30× 60cm、使用土壌 約 1.5~4ℓ)当り 50g	育苗期後半 ~定植当日	1 回	本剤の所定量を セル成型育苗 トレイまたは ペーパーポット の上から均一に 散布する。	4 回以内 (定植時までの 処理は 1 回以内、 定植後の処理は 3 回以内)	
		1g/株	育苗期後半 ~定植時		株元散布		
はくさい ブロッコリー	コナガ ハイマダラノメイガ アオムシ	セル成型育苗トレイ 1 箱またはペーパー ポット 1 冊(約 30× 60cm、使用土壌 約 1.5~4ℓ)当り 50g	育苗期後半 ~定植当日		本剤の所定量を セル成型育苗 トレイまたは ペーパーポット の上から均一に 散布する。		
		1g/株	育苗期後半 ~定植時		株元散布		
レタス	ナモグリバエ オオタバコガ	セル成型育苗トレイ 1 箱またはペーパー ポット 1 冊(約 30× 60cm、使用土壌 約 1.5~4ℓ)当り 50g	育苗期後半 ~定植当日		本剤の所定量を セル成型育苗 トレイまたは ペーパーポット の上から均一に 散布する。		
		1g/株	育苗期後半 ~定植時		株元散布		
トマト	ネキリムシ類 ハモグリバエ類	1g/株	育苗期後半 ~定植時		株元散布		4 回以内 (定植時までの 処理は 1 回以内、 散布は 3 回以内)
きゅうり	ハモグリバエ類						3 回以内 (定植時までの 処理は 1 回以内、 散布は 2 回以内)
なす	ネキリムシ類 ハモグリバエ類						
さとうきび	メイチュウ類	4~6kg/10a	植付時		植溝土壌混和		4 回以内 (粒剤は 1 回以内、 水和剤は 3 回以内)
			生育期 但し 最終培土まで	株元散布			
	ツマジロクサヨトウ	6kg/10a	植付時	植溝土壌混和			
			生育期 但し 最終培土まで	株元散布			

