

【適用害虫と使用方法】

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用方法	シアントラニプロール を含む農薬の 総使用回数
キャベツ	コナガ アオムシ アブラムシ類 アザミウマ類 ハイマダラノメイガ	※1	育苗期後半 ～定植当日	1 回	※2	4 回以内 (定植時までの処理は 1 回以内、 定植後の処理は 3 回以内)
	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ	1g/株	育苗期後半 ～定植時		株元散布	
	アブラムシ類 アザミウマ類	2g/株				
	ハイマダラノメイガ アブラムシ類	苗地床 1 m ² 当り 100g	育苗期		散布	
はくさい	コナガ アオムシ アブラムシ類 ハイマダラノメイガ	※1	育苗期後半 ～定植当日		※2	
	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ	1g/株	育苗期後半 ～定植時		株元散布	
	アブラムシ類	2g/株				
ブロッコリー	コナガ アオムシ アブラムシ類 アザミウマ類	※1	育苗期後半 ～定植当日		※2	
	コナガ アオムシ	1g/株	育苗期後半 ～定植時		株元散布	
	アブラムシ類 アザミウマ類	2g/株				
レタス	オオタバコガ アブラムシ類 ハモグリバエ類	※1	育苗期後半 ～定植当日		※2	
	オオタバコガ ハモグリバエ類	1g/株	育苗期後半 ～定植時		株元散布	
	アブラムシ類		鉢上げ時		育苗培土混和	
ピーマン	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類	2g/株	育苗期後半 ～定植時		株元散布	4 回以内 (定植時までの処理 及び定植直後の 株元灌注は合計 1 回 以内、定植後の散布は 3 回以内)

※1: セル成型育苗トレイ 1 箱またはペーパーポット 1 冊 (約 30×60cm、使用土壌約 1.5～4ℓ) 当り 50g

※2: 本剤の所定量をセル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から均一に散布する。

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用方法	シアントラニプロール を含む農薬の 総使用回数	
ねぎ	アザミウマ類 ハモグリバエ類 シロイチモジヨトウ ネギコガ	6kg/10a	収穫前日 まで	3 回 以内	株元散布	4 回以内 (定植時までの処理は 1 回以内、定植後の処理 は 3 回以内(但し、株元 灌注は 1 回以内))	
トマト ミニトマト	コナジラミ類	2g/株	鉢上げ時	1 回	育苗培土混和	5 回以内 (定植時までの処理 及び定植直後の 株元灌注は合計 1 回 以内、定植後の株元 灌注は 1 回以内、定植 後の散布は 3 回以内)	
	ハモグリバエ類 アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類 トマトキバガ		育苗期後半 ～定植時		株元散布		
なす	ハモグリバエ類 アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類		定植時		育苗培土混和	1 回	
なばな類	アブラムシ類						
きゅうり	ハモグリバエ類 アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類		鉢上げ時		育苗培土混和	4 回以内 (定植時までの処理 及び定植直後の 株元灌注は合計 1 回 以内、定植後の散布は 3 回以内)	
	ハモグリバエ類 アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類		育苗期後半 ～定植時		株元散布		
すいか メロン	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類		は種時		全面土壌散布	1 回	
だいこん	コナガ アオムシ アブラムシ類 ハイマダラノメイガ カブラハバチ類 キスジノミハムシ ネキリムシ類	6kg/10a			播溝土壌混和		
畑わさび	アザミウマ類 ワサビルリイロサルゾウムシ	収穫 21 日 前まで			全面土壌散布	1 回	

