

【適用害虫と使用方法】

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ビフェントリンを 含む農薬の 総使用回数
芝	シバツトガ スジキリヨトウ	1500 倍	300ℓ/10a	発生初期	3 回以内	散布	3 回以内
		500 倍	100ℓ/10a				
		400 倍	80ℓ/10a				
		200 倍	40ℓ/10a				
		100 倍	20ℓ/10a				
		50 倍	10ℓ/10a				
		16 倍	3.2ℓ/10a			無人航空機 による散布	
		15 倍	3.0ℓ/10a				
		10 倍	2.0ℓ/10a				
		8 倍	1.6ℓ/10a				
		5 倍	1.0ℓ/10a				
		4 倍	0.8ℓ/10a				
	スジキリヨトウ	2000 倍	200ℓ/10a		6 回以内	散布	
	ケラ	500 倍	500ℓ/10a			無人航空機 による散布	
		4 倍	4ℓ/10a			散布	
花き類・観葉植物	ハダニ類 アブラムシ類	1000 倍	150～300 ℓ/10a	6 回以内	散布	6 回以内	
樹木類	ケムシ類		200～700 ℓ/10a				