

【適用害虫と使用方法】

作物名	適用害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用方法	クロントラニリプロール を含む農薬の 総使用回数
りんご	シンクイムシ類 ハマキムシ類 ケムシ類 キンモンホソガ ギンモンハモグリガ ヒメボクトウ ヨモギエダシャク オオタバコガ ヨトウムシ	2500～ 5000倍	200～700 ℓ/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
なし	ケムシ類 シンクイムシ類 ハマキムシ類 ヒメボクトウ						
かき	ハマキムシ類 ケムシ類 ヒロヘリアオイラガ カキノヘタムシガ ハスモンヨトウ フタモンマダラメイガ	5000倍					
ぶどう	ハマキムシ類 ケムシ類 モンキクロノメイガ クビアカスカシバ ハスモンヨトウ						
おうとう	コスカシバ ハマキムシ類 ケムシ類	2500～ 5000倍					
	オウトウショウジョウバエ	2500倍					
うめ	ケムシ類 ノコメタリキリガ コスカシバ	2500～ 5000倍					
	ハマキムシ類 シンクイムシ類	2500倍					
すもも	ケムシ類 ハマキムシ類	2500～ 5000倍					
あんず		2500倍					
ふさすぐり	スグリコスカシバ						
もも	シンクイムシ類 ハマキムシ類 モモハモグリガ コスカシバ	5000倍					
ネクタリン							
さとうきび	メイチュウ類 ツマジロクサヨトウ	5000倍	100～300 ℓ/10a	収穫30日前 まで	3回以内	無人航空機 による散布	4回以内 (粒剤は1回以内、 水和剤は3回以内)
		50倍	2.4ℓ/10a				
茶	チャノコカクモンハマキ チャハマキ ヨモギエダシャク	2000倍	200～400 ℓ/10a	摘採3日前 まで	1回	散布	1回
	チャノホソガ ハスモンヨトウ	2000～ 4000倍					

