

【適用病害と使用方法】

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用方法	フルキサピロキサト [®] を含む農薬の 総使用回数
日本芝	葉腐病 (ラージパッチ)	400～800 倍	200mℓ/㎡	発病初期	4 回 以内	散布	4 回以内
		2000 倍	500mℓ/㎡			無人航空機 による散布	
		6.4～12.8 倍	3.2mℓ/㎡			散布	
		3.2～6.4 倍	1.6mℓ/㎡				
	フェアリーリング病	800 倍	200mℓ/㎡			散布	
	カーブラリア葉枯病	400 倍	100mℓ/㎡				
		2000 倍	500mℓ/㎡				
		12.8 倍	3.2mℓ/㎡				
		6.4 倍	1.6mℓ/㎡				
		3.2 倍	0.8mℓ/㎡				
	ダラースポット病	666 倍	200mℓ/㎡	発病前～ 発病初期		散布	
		10.6 倍	3.2mℓ/㎡			無人航空機 による散布	
		5.3 倍	1.6mℓ/㎡				
		2.6 倍	0.8mℓ/㎡				
	立枯病 (ゾイシアデクライン)	400～800 倍	200mℓ/㎡			散布	
		1000 倍	500mℓ/㎡				
	疑似葉腐病 (象の足跡)	800 倍	200mℓ/㎡			無人航空機 による散布	
		12.8 倍	3.2mℓ/㎡				
		6.4 倍	1.6mℓ/㎡				
		3.2 倍	0.8mℓ/㎡				
	疑似葉腐病 (春はげ症)	800 倍	200mℓ/㎡	休眠期前		散布	
		2000 倍	500mℓ/㎡				
	ネクロティック リングスポット病	400～800 倍	200mℓ/㎡	休眠期前 及び萌芽前			
		1000～2000 倍	500mℓ/㎡				
西洋芝 (ベント グラス)	雪腐小粒菌核病	400 倍	100mℓ/㎡	根雪前			
		2000 倍	500mℓ/㎡				

