

【適用害虫と使用方法】

作物名	適用害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	シアントラニプロール を含む農薬の 総使用回数
キャベツ	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ アブラムシ類 アザミウマ類 ネキリムシ類 ウワバ類 シロイチモジヨトウ キスジノミハムシ	400 倍	セル成型育苗トレイ 1 箱または ペーパーポット 1 冊 (約 30×60cm、 使用土壌約 1.5～ 4ℓ) 当り 0.5ℓ	育苗期後半 ～定植当日	1 回	灌注	4 回以内 (定植時までの 処理は 1 回以内、 定植後の処理は 3 回以内)
はくさい	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ カブラハバチ類 アブラムシ類 シロイチモジヨトウ キスジノミハムシ ハイマダラノメイガ			は種覆土後 ～定植当日			
トマト ミニトマト	コナジラミ類	200 倍	1～3ℓ/㎡	育苗期後半 ～定植当日		株元 灌注	5 回以内 (定植時までの 処理及び定植 直後の株元灌注 は合計 1 回以内、 定植後の株元 灌注は 1 回以内、 定植後の散布は 3 回以内)
		10000 倍		定植 14 日後 まで			
ブロッコリー	ハイマダラノメイガ	400 倍	セル成型育苗トレイ 1 箱または ペーパーポット 1 冊 (約 30×60cm、 使用土壌約 1.5～ 4ℓ) 当り 0.5ℓ	は種覆土後 ～定植当日	1 回	灌注	4 回以内 (定植時までの 処理は 1 回以内、 定植後の処理は 3 回以内)
	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ アブラムシ類 アザミウマ類 シロイチモジヨトウ			育苗期後半 ～定植当日			
レタス 非結球レタス	オオタバコガ ハスモンヨトウ ヒメフタテンヨコバイ ハモグリバエ類 アブラムシ類 ウワバ類 シロイチモジヨトウ コオロギ類			定植当日			
カリフラワー	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ			育苗期後半 ～定植当日			
しそ	アブラムシ類						1 回

作物名	適用害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	シアントリニプロール を含む農薬の 総使用回数
ねぎ	タマネギバエ タネバエ	400 倍	セル成型育苗トレイ 1 箱または ペーパーポット 1 冊 (約 30×60cm、 使用土壌約 1.5～ 4ℓ) 当り 0.5ℓ	育苗期後半 ～定植当日	1 回	灌注	4 回以内 (定植時までの 処理は 1 回以内、 定植後の処理は 3 回以内(但し、 株元灌注は 1 回以内))
	シロイチモジヨトウ アザミウマ類 ハモグリバエ類 ネキリムシ類 ネギコガ		0.5ℓ/㎡			株元 灌注	
ほうれんそう	ハスモンヨトウ	2000 倍	0.1ℓ/㎡	収穫 7 日前 まで	1 回	灌注	1 回
	シロオビノメイガ アブラムシ類						
非結球あぶらな科 葉菜類 (ケールを除く)	アオムシ コナガ アブラムシ類	4000 倍	0.2ℓ/㎡		1 回	灌注	2 回以内 (定植時までの 処理は 1 回以内、 定植後の処理は 1 回以内)
ケール	ネキリムシ類	400 倍	セル成型育苗トレイ 1 箱または ペーパーポット 1 冊 (約 30×60cm、 使用土壌約 1.5～ 4ℓ) 当り 0.5ℓ	定植当日			
いちご	ハスモンヨトウ	1000 倍	25～50ml/株	育苗期後半	1 回	灌注	4 回以内 (定植時までの 処理及び定植 直後の株元灌注 は合計 1 回以内、 定植後の散布は 3 回以内)
	アザミウマ類 コナジラミ類 コガネムシ類 チバクロバネキノコバエ		50ml/株	育苗期後半 ～定植当日			
	アブラムシ類		25～50ml/株				
	ハスモンヨトウ	10000 倍	500ml/株	定植直後		株元 灌注	

作物名	適用害虫名	使用量		使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	シアントラニプロール を含む農薬の 総使用回数	
		薬量	希釈水量					
きゅうり	アブラムシ類	400 株当り 25mℓ	400 株当り 2～20ℓ (1 株当り 5～50mℓ)	育苗期後半 ～定植当日	1 回	灌注	4 回以内 (定植時までの 処理及び定植 直後の株元灌注 は合計 1 回以内、 定植後の散布は 3 回以内)	
	アザミウマ類		400 株当り 20～200ℓ (1 株当り 50～500mℓ)	定植直後		株元 灌注		
			400 株当り 20ℓ (1 株当り 50mℓ)					
	アザミウマ類 コナジラミ類 ハモグリバエ類					灌注	5 回以内 (定植時までの 処理及び定植 直後の株元灌注 は合計 1 回以内、 定植後の株元 灌注は 1 回以内、 定植後の散布は 3 回以内)	
トマト ミニトマト	アブラムシ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類 トマトキバガ コナジラミ類		400 株当り 10～20ℓ (1 株当り 25～50mℓ)	育苗期後半 ～定植当日				株元 灌注
	コナジラミ類		400 株当り 20～200ℓ (1 株当り 50～500mℓ)	定植直後				
ピーマン	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類		400 株当り 10～20ℓ (1 株当り 25～50mℓ)	育苗期後半 ～定植当日		灌注	4 回以内 (定植時までの 処理及び定植直 後の株元灌注は 合計 1 回以内、 定植後の散布は 3 回以内)	
	コガネムシ類		400 株当り 10ℓ (1 株当り 25mℓ)					
	アブラムシ類		400 株当り 20～200ℓ (1 株当り 50～500mℓ)	定植直後				株元 灌注
なす	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類 ハモグリバエ類 ネキリムシ類		400 株当り 10～20ℓ (1 株当り 25～50mℓ)	育苗期後半 ～定植当日		灌注	1 回	
	アブラムシ類		400 株当り 20～200ℓ (1 株当り 50～500mℓ)	定植直後		株元 灌注		
メロン すいか	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類		400 株当り 10～20ℓ (1 株当り 25～50mℓ)	育苗期後半 ～定植当日		灌注		株元 灌注
	アブラムシ類		400 株当り 20～200ℓ (1 株当り 50～500mℓ)	定植直後				
ししとう	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類			400 株当り 10ℓ (1 株当り 25mℓ)		育苗期後半 ～定植当日	灌注	4 回以内 (灌注は 1 回以内、 散布は 3 回以内)

