

【適用雑草と使用方法】

作物名	適用場所	適用雑草木名	使用時期	薬量又は希釈倍数	使用液量	本剤の使用回数	使用方法	トリクロピルを含む農薬の総使用回数
日本芝	—	一年生広葉雑草 クローバー、 チドメグサ等の 多年生広葉雑草	雑草生育期	200～600 mℓ/10a	150～200 ℓ/10a	3 回 以内	雑草茎葉散布	3 回以内
樹木等	公園 庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 のり面等	一年生広葉雑草 多年生広葉雑草		500～1000 mℓ/10a	200～250 ℓ/10a		植栽地を除く 樹木等の 周辺地に 雑草茎葉散布	
		ニセアカシア	3 月～9 月	20 倍	10～20mℓ /株径 10cm	切株処理		
				3 倍	3mℓ /樹径 8～9cm	立木処理		
すぎ (下刈り) ひのき (下刈り)	—	落葉雑かん木 一年生広葉雑草 多年生広葉雑草 クズ	雑草木の 新葉展開後 ～生育期	350 mℓ/10a	30ℓ/10a	雑草木 茎葉散布	2 回 以内	
林木	造林地	雑かん木	4 月～10 月	10～15 倍	45 mℓ /株径 15cm	切株処理		
		クズ		25 倍	10～20 mℓ /株径 3～5cm	株頭処理		
		クズ・フジ等の つる類	11 月～5 月	3 倍	1 mℓ/株	つる切り処理		
		ニセアカシア	3 月～9 月	20 倍	10～20 mℓ /株径 10cm	切株処理		
				3 倍	3 mℓ /樹径 8～9cm	立木処理		

