

## 水田畦畔除草の労力軽減に

# カーメックス<sup>®</sup> 顆粒水和剤

カーメックス<sup>®</sup>はイスラエル国アダマ・アグリカルチュラル・ソリューションズ・グループの登録商標です。

水和剤から「**顆粒水和剤**」に**剤型変更!!**

★**計量しやすくなりました!**

★**粉立ちが大幅に改善されました!**

より使い  
やすく  
なりました!!

顆粒水和剤




※300gボトルのキャップ  
すりきり一杯で約15gです。



100g袋入り

300gボトル入り



※社内試験 場所:群馬県内 散布日:2014年6月17日 薬量:300g/10a 水量:100ℓ/10a (単剤処理)

カメムシ対策に  
畦畔の雑草管理は  
大切です!!



カーメックス<sup>®</sup> 雑草の発生をなが〜くおさえます!

散布


30日

60日

登録内容 (関連項目のみ一部抜粋)

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10アール当りの使用量		使用方法	本剤の使用回数	DCMUを含む農業の総使用回数
				薬量	希釈水量			
水田作物 (水田畦畔)	水田畦畔	一年生雑草	雑草発生前	150~300g	25~300ℓ	全面土壌散布 雑草茎葉散布又は 全面土壌散布	1回	1回
			雑草発発生始期~ 発生揃期		70~100ℓ			

## ● 散布タイミングの例 ●



## ● 効果を最大限引き出すには

- (1) 雑草発生前には…土壌水分が適度にある方が土壌処理効果が安定するので**降雨後の散布**が有効です!!
- (2) 雑草発生揃期(草丈 10cm 以下まで)に処理する場合には…単用処理の場合には除草剤用の展着剤(サーファクタント 30 等)を加えると茎葉処理効果がアップします!!
- (3) 優占草種を見て…一部のキク科雑草、イネ科雑草、大きくなった雑草(草丈 10 cm以上)には効果が弱いので、**茎葉処理剤との同時処理**をお勧めします!!

## ● 散布のめやす

〈前提条件〉

- 畦畔の幅：1m
- 散布薬量：300g/10a
- 散布水量：100ℓ/10a

散布器具の水量	畦畔の長さ(散布面積)	使用薬量
10ℓ	長さ100m(100㎡)	30g
18ℓ	長さ180m(180㎡)	54g
33.3ℓ	長さ333m(333㎡)	100g

※使用薬量、および散布水量は、必ず散布面積に合わせてください。いずれかが基準量より少ないと、効果の劣る場合があります。

## 注意事項(抜粋)

- 散布液が**農作物(水稻)**にかからないように注意してください。
- 塗り畦に使用する場合、**畦塗り直後**で畦が濡れているときは、**水田に流入して薬害を生じるおそれ**があるので使用しないでください。
- 散布液が水田に流入する恐れがあるところでは**使用しないでください**。とくに**透水性の大きな畦畔、砂質土では完全に除草すると畦が崩れたり、散布液が水田に流入し、水稻に薬害を生じるおそれ**があるので**使用しないでください**。
- **翌年に移動する畦畔、または崩して水田にする畦畔には使用しないでください**。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。

お求めは…

販売元



丸和バイオケミカル株式会社

- 本社 / 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-19-23  
TEL03-5296-2314
  - 札幌 / TEL011-222-1285 ■ 仙台 / TEL022-261-1103
  - 名古屋 / TEL052-951-7234 ■ 大阪 / TEL06-6484-6850
  - 福岡 / TEL092-714-7101
- <https://www.mbc-g.co.jp>

お問い合わせ窓口 / TEL 03-5962-9731 (9時～17時 土日祝を除く)