

【適用害虫と使用方法】

作物名	適用害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用方法	クロラントリニプロール を含む農薬の 総使用回数
キャベツ	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ ネキリムシ類 カブラハバチ類	100倍	※1	育苗期後半 ～定植当日	1回	灌注	4回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 定植後の処理 は3回以内)
	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ ウワバ類	500倍	苗地床 1㎡当り2ℓ				
	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ ウワバ類 オオタバコガ	2000倍	100～300 ℓ/10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	
		20倍	1～2 ℓ/10a			無人航空機 による散布	
はくさい	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ カブラハバチ類	100倍	※1	育苗期後半 ～定植当日	1回	灌注	
	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ カブラハバチ類 オオタバコガ	2000倍	100～300 ℓ/10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	
		20倍	1～2 ℓ/10a			無人航空機 による散布	
かぶ	コナガ	2000倍	100～300 ℓ/10a		育苗期後半 ～定植当日	2回 以内	散布
非結球あぶらな科 葉菜類(タアサイ、 非結球はくさい、 なばな類を除く)	コナガ ハモグリバエ類			2回以内			
タアサイ	オオタバコガ			100倍		※1	育苗期後半 ～定植当日
非結球はくさい	ハスモンヨトウ	2000倍	100～300 ℓ/10a	収穫前日 まで	2回 以内	散布	4回以内 (灌注は1回以内、 散布は3回以内)
なばな類	コナガ ハモグリバエ類 アオムシ ハスモンヨトウ				3回 以内		
	アオムシ			100倍	※1	育苗期後半 ～定植当日	
アマランサス (茎葉)	シロオビノメイガ	2000倍	100～300 ℓ/10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	3回以内

※1: セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5～4ℓ)当り0.5ℓ

作物名	適用害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用方法	クロントラコリフロール を含む農薬の 総使用回数
だいこん	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ カブラハバチ類 ハモグリバエ類	2000倍	100～300 ℓ/10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	3回以内
		20倍	1～2 ℓ/10a			無人航空機 による散布	
はつかだいこん	キアゲハ	2000倍	100～300 ℓ/10a		1回	散布	1回
にんじん		20倍	1～2 ℓ/10a		2回 以内	無人航空機 による散布	2回以内
てんさい	ヨトウムシ シロオビノメイガ	4000～ 5000倍	100～300 ℓ/10a			3回 以内	
カリフラワー	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ	2000倍	※1	育苗期後半 ～定植当日	1回		灌注
ブロッコリー		コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ オオタバコガ			2000倍	100～300 ℓ/10a	3回 以内
	20倍		1～2 ℓ/10a	散布	4回以内 (灌注は1回以内、 散布は3回以内)		
茎ブロッコリー	ハスモンヨトウ	2000倍	100～300 ℓ/10a	育苗期後半 ～定植当日	1回	灌注	4回以内 (灌注は1回以内、 散布は3回以内)
		100倍	※1				
レタス	ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ	2000倍	100～300 ℓ/10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	4回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 定植後の処理は 3回以内)
		20倍	1～2 ℓ/10a			無人航空機 による散布	
	ハモグリバエ類	1000～ 2000倍	100～300 ℓ/10a			散布	
非結球レタス	ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ ハモグリバエ類 ネキリムシ類 ヒメフタテンヨコバイ	100倍	※1	育苗期後半 ～定植当日	1回	灌注	
		2000倍	100～300 ℓ/10a			収穫前日 まで	
	20倍	1～2 ℓ/10a	無人航空機 による散布				

※1: セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5～4ℓ)当り0.5ℓ

作物名	適用害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用方法	クロントラニプロール を含む農薬の 総使用回数			
トマト	ハモグリバエ類	1000～ 2000倍	100～300 ℓ/10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	4回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 散布は3回以内)			
	オオタバコガ トマトキバガ	2000倍								
	トマトキバガ	100 倍	1株当り 25mℓ	育苗期後半 ～定植当日	1 回	灌注				
	ハモグリバエ類 コナジラミ類		200 倍					1株当り 50mℓ		
ミニトマト	トマトキバガ	100 倍	1株当り 25mℓ				収穫前日 まで	3回 以内	散布	4回以内 (灌注は1回以内、 散布は3回以内)
	ハモグリバエ類 コナジラミ類	200 倍	1株当り 50mℓ							
	ハモグリバエ類 オオタバコガ トマトキバガ	2000倍	100～300 ℓ/10a							
なす	ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 ネキリムシ類	100倍	1株当り 25mℓ	育苗期後半 ～定植当日	1回	灌注	3回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 散布は2回以内)			
	ハモグリバエ類	200倍	1株当り 50mℓ							
		ハスモンヨトウ オオタバコガ	1000～ 2000倍	100～300 ℓ/10a	収穫前日 まで	2回 以内		散布		
	1000～ 2000倍									
とうがらし類	ハスモンヨトウ コナジラミ類	100倍	1株当り 25mℓ	育苗期後半 ～定植当日	1回	灌注	4回以内 (灌注は1回以内、 散布は3回以内)			
	ハスモンヨトウ オオタバコガ	1000～ 2000倍	1株当り 25mℓ	収穫前日 まで	3回 以内	散布				
ピーマン	ハスモンヨトウ オオタバコガ	1000～ 2000倍	100～300 ℓ/10a	収穫前日 まで	2回 以内	散布	3回以内 (灌注は1回以内、 散布は2回以内)			
	ハスモンヨトウ コナジラミ類	100倍	1株当り 25mℓ	育苗期後半 ～定植当日	1回	灌注				
きゅうり	ハモグリバエ類	100～ 200倍	1株当り 50mℓ				収穫前日 まで	3回 以内	散布	4回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 散布は3回以内)
		200倍								
		1000～ 2000倍								
	ウリノメイガ	2000倍								
ズッキーニ	ハモグリバエ類	1000倍	100～300 ℓ/10a	収穫前日 まで	2回 以内	3回以内				
メロン すいか	オオタバコガ ハモグリバエ類									
とうがん にがうり	ハスモンヨトウ	2000倍		※2	1回					
いちご										
せり科葉菜類 (パセリを除く)	ヨトウムシ			収穫7日前 まで						
パセリ	ヨトウムシ ハスモンヨトウ									

※2: 収穫7日前まで但し、みつばの伏せ込み栽培は伏せ込み前まで

作物名	適用害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用方法	クロントラニプロール を含む農薬の 総使用回数
らっきょう	ハモグリバエ類	2000倍	100～300 ℓ/10a	収穫3日前 まで	3回 以内	散布	3回以内
ねぎ	シロイチモジヨトウ ネギコガ ハモグリバエ類		1～2 ℓ/10a			無人航空機 による散布	4回以内 (灌注は1回以内、 定植後の処理は 3回以内)
	ハモグリバエ類	20 倍	※1	育苗期後半 ～定植当日	1回	灌注	
豆類 (種実、ただし、 だいず、あずき、 らっかせいを除く)	ハスモンヨトウ	4000倍	100～300 ℓ/10a	収穫7日前 まで	2回 以内	散布	2回以内
だいず	ハスモンヨトウ マメシクイガ ウコンノメイガ オオタバコガ		16～32 倍			無人航空機 による散布	
あずき	ハスモンヨトウ アズキノメイガ	4000倍	100～300 ℓ/10a	収穫3日前 まで		散布	
えだまめ	ハスモンヨトウ マメシクイガ ウコンノメイガ オオタバコガ		16～32 倍			無人航空機 による散布	
未成熟ささげ	ハスモンヨトウ	2000倍	100～300 ℓ/10a			散布	
未成熟そらまめ	ハモグリバエ類	1000～ 2000倍					
さやいんげん 実えんどう さやえんどう	ハスモンヨトウ ハモグリバエ類	2000倍	100～300 ℓ/10a			散布	
やまのいも	ハスモンヨトウ ナガイモコガ						
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ アリモドキゾウムシ ヒルガオハモグリガ	2000～ 4000倍	100～300 ℓ/10a	収穫前日 まで		無人航空機 による散布	
		16倍	0.8～1.6 ℓ/10a			散布	
さといも	ハスモンヨトウ	2000倍	100～300 ℓ/10a			無人航空機 による散布	
		20倍	1～2 ℓ/10a			散布	
アスパラガス	ハスモンヨトウ シロオビノメイガ					散布	
ほうれんそう	ハスモンヨトウ						
モロヘイヤ エンサイ	ハスモンヨトウ	2000倍	100～300 ℓ/10a		2回 以内		2回以内
つるむらさき しそ科葉菜類 (えごま(葉)を除く)					3回 以内		3回以内
えごま(葉) ふき	ハスモンヨトウ			収穫3日前 まで	2回 以内		
ふき(ふきのとう)				収穫120日 前まで			

※1: セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5～4ℓ)当り0.5ℓ

作物名	適用害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用方法	クロントラニリプロール を含む農薬の 総使用回数
クレソン (土耕栽培)	コナガ	2000倍	100～300 ℓ/10a	収穫3日前 まで	3回 以内	散布	3回以内
ごま	オオタバコガ			収穫14日前 まで	2回 以内		2回以内
飼料用とうもろこし (子実)	アワノメイガ ツマジロクサヨトウ	2000～ 4000倍	1～2 ℓ/10a	収穫前日 まで	3回 以内	無人航空機 による散布	4 回以内 (は種前の塗沫 処理は 1 回以内、 は種後は3回以内)
		20～40 倍					
	アワノメイガ ツマジロクサヨトウ オオタバコガ	16倍	1.6ℓ/10a			散布	
		オオタバコガ	2000倍				
	20倍		1～2 ℓ/10a				
とうもろこし	アワノメイガ オオタバコガ ツマジロクサヨトウ	2000倍	100～300 ℓ/10a			散布	
		20倍	1～2 ℓ/10a				
		16倍	1.6ℓ/10a				
オクラ	オオタバコガ ハスモンヨトウ	2000倍	100～300 ℓ/10a			散布	3 回以内
		20倍	1～2 ℓ/10a				
しょうが	ハスモンヨトウ	2000倍	100～300 ℓ/10a			散布	
		20倍	1～2 ℓ/10a				
たばこ	ヨトウムシ	2000倍	100～180 ℓ/10a	収穫10日前 まで	2回 以内	散布	2回以内
とうき	キアゲハ		100～300 ℓ/10a	発生初期	4回 以内		4回以内

