

新規適用拡大!

スジキリヨトウ、シバツトガに
少水量散布 (10~80ml/m²) が可能になりました

スプレーヤー・スパウター散布に!

殺虫剤

ピンチショット

フロアブル

®は丸和バイオケミカル株式会社の登録商標です。



適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ピフェントリンを含む 農薬の総使用回数
芝	スジキリヨトウ	2000倍	200ℓ/10a	発生初期	3回以内	散布	3回以内
		1500倍	300ℓ/10a				
		500倍	100ℓ/10a				
		400倍	80ℓ/10a				
		200倍	40ℓ/10a				
		100倍	20ℓ/10a				
		50倍	10ℓ/10a				
		16倍	3.2ℓ/10a				
		15倍	3.0ℓ/10a				
		10倍	2.0ℓ/10a				
		8倍	1.6ℓ/10a				
		5倍	1.0ℓ/10a				
		4倍	0.8ℓ/10a				
	シバツトガ	1500倍	300ℓ/10a				
		500倍	100ℓ/10a				
		400倍	80ℓ/10a				
		200倍	40ℓ/10a				
		100倍	20ℓ/10a				
		50倍	10ℓ/10a				
		16倍	3.2ℓ/10a				
		15倍	3.0ℓ/10a				
		10倍	2.0ℓ/10a				
		8倍	1.6ℓ/10a				
		5倍	1.0ℓ/10a				
		4倍	0.8ℓ/10a				
		ケラ	500倍			500ℓ/10a	
	4倍		4.0ℓ/10a				
花き類・ 観葉植物	ハダニ類 アブラムシ類	1000倍	150～300ℓ/10a		6回以内	散布	6回以内
樹木類	ケムシ類		200～700ℓ/10a				

※赤字部分が今回の変更点になります(2024年7月現在)



丸和バイオケミカル株式会社



病害虫・雑草の情報
発信しています
登録はコチラ▼



効果の特長

- 👉 接触効果にすぐれ**即効的に効果**を発揮します。
- 👉 土壌中で流亡しづらく、分解が緩やかなため**効果の持続性**に優れます。
- 👉 **チョウ目害虫**、ケラ(バッタ目)、ハダニ類、アブラムシ類と幅広い害虫に高い効果を発揮します。

成分・性状等

- 有効成分：ピフェントリン 2.0%
- 普通物 ※毒劇物に該当しないものを指している通称
- 性状：類白色水和性粘稠懸濁液体
- 有効年限：4年
- 包装：500ml×12本入

作用の仕組み

合成ピレスロイド系で神経に作用し殺虫効果を発揮します。
IRACグループ3A (ナトリウムチャンネルモジュレーター) に属します。

⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。
- 使用前によく振ってから使用してください。
- カラー及び花はすに使用する場合は、湛水状態で使用しないでください。また、使用後14日間は入水しないでください。
- 本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意事項を守ってください。
 - ・散布は散布機種種の散布基準に従って実施してください。
 - ・散布に当たっては散布機種種に適合した散布装置を使用してください。
 - ・散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
- ミツバチに対する注意
 - ・ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。無人航空機による散布でそれらに飛散するおそれがある場合には使用しないでください。
 - ・ミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
 - ・関係機関(都道府県の農業指導部や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
-  蚕に長期間毒性があるので、付近に桑園がある所では使用をさけてください。
- 本剤の散布の際に着用していた衣服は養蚕作業に用いるものと区別してください。
- 収穫間際の散布は、花弁や葉に汚れを生じる場合がありますのでさけてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

⚠ 安全使用上の注意

- 誤飲に注意してください。誤って飲み込んだ場合は吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。使用中に異常を感じた時は、直ちに医師の手当を受けてください。
-  散布時は、農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをし、衣服を換えてください。作業時の衣服などは他と分けて洗濯してください。
- かぶれやすい人は取り扱いに十分注意してください。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中及び散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせないでください。小児、人畜等に留意してください。

治 療 法 筋弛緩薬(メトカルバモール製剤等)の投与が有効です(動物実験で報告)。

- 魚毒性等**
- 河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意してください(魚類・甲殻類)。
 - 無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。
 - 散布器具・容器の洗浄水は河川等に流さないでください。また、空容器は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 保 管** 密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷蔵な所に保管してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。

■お求めは…

■販売元



丸和バイオケミカル株式会社

ユニカス 事業部

- 本 社 / 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-19-23
TEL 03-5296-2340
 - 札 幌 / TEL 011-222-2305 ■仙 台 / TEL 022-261-1319
 - 名古屋 / TEL 052-951-7235 ■大 阪 / TEL 06-6484-7222
 - 福 岡 / TEL 092-712-8330
- <https://www.mbc-g.co.jp>

お問い合わせ窓口 / TEL 03-5962-9731 (9時~17時 土日祝を除く)

ユニカスは日本ジュニアgolfer育成協議会(JGC)を応援しています。