

【適用雑草と使用方法】

作物名	適用 雑草名	使用時期	使用量		本剤 の 使用 回数	使用方法	リニュロン を含む農薬の 総使用回数
			薬量	希釈水量			
りんご もも かき	一年生 雑草	雑草発生前～発生始期 但し、収穫 30 日前まで	300g/10a	70～150 ℓ/10a	1 回	全面土壌散布	1 回
なし		雑草発生前～発生始期 但し、収穫 90 日前まで					
麦類(秋播)		は種後～発芽前 (雑草発生前～発生始期)	100～200 g/10a		1 回	雑草茎葉兼 土壌散布 (畦間・株間処理)	2 回以内 (全面土壌散布は 1 回以内、 雑草茎葉兼土壌 散布は 1 回以内)
だいず えだまめ		は種直後～出芽前 (雑草発生前～発生始期)	100～200 g/10a				
		本葉 3 葉期以降 但し、収穫 30 日前まで (雑草生育期)					
いんげん まめ		は種直後	100～150 g/10a		1 回	全面土壌散布	1 回
べにばな いんげん		は種後出芽前 (雑草発生前)	75～100 g/10a				
らっかせい とうもろこし 飼料用 とうもろこし		は種直後	100～200 g/10a				
		は種直後(雑草発生前)					
ソルガム		は種直後			1 回		
にんじん		にんじん 3 葉期以降 但し、収穫 30 日前まで	100～150 g/10a		1 回	雑草茎葉散布 又は全面散布	2 回以内 (は種直後は 1 回以内、 にんじん 3 葉期 以降は 1 回以内)
にんじん (葉)		は種後出芽前 (雑草発生前)	100～200 g/10a		1 回	全面土壌散布	1 回
かんしょ		種いも植付後萌芽前まで	200g/10a		1 回		
		苗移植前まで	150～200 g/10a			雑草茎葉兼 土壌散布 (畦間処理)	2 回以内 (全面土壌散布は 1 回以内、 雑草茎葉兼土壌 散布は 1 回以内)
ばれいしょ	生育期 但し、収穫 45 日前まで (雑草生育期)	100～200 g/10a	1 回		全面土壌散布		
さといも こんにゃく	植付直後～萌芽前		1 回			全面土壌散布	1 回
やまのいも	植付直後				2 回 以内		
	生育期 但し、収穫 60 日前まで (雑草発生前～発生揃期)						

作物名	適用 雑草名	使用時期	使用量		本剤 の 使用 回数	使用方法	リニュロン を含む農薬の 総使用回数
			薬量	希釈水量			
やまのいも (むかご)	一年生 雑草	植付直後	100～200 g/10a	70～150 ℓ/10a	2 回 以内	全面土壌散布	2 回以内
		生育期 但し、収穫 60 日前まで (雑草発生前～発生揃期)				畦間土壌散布	
アスパラ ガス		萌芽前 (雑草発生前～発生始期)	150～200 g/10a	100～150 ℓ/10a	1 回	全面土壌散布	2 回以内 (全面土壌散布は 1 回以内、 雑草茎葉兼土壌 散布は 1 回以内)
		萌芽始期 但し、収穫前日まで (雑草発生前～発生始期)					
	一年生 広葉 雑草	生育期 但し、収穫前日まで (雑草生育期)		100ℓ/10a	1 回	雑草茎葉兼 土壌散布 (畦間・株間処理)	
にんにく	一年生 雑草	植付前(マルチ前) (雑草発生前)	100～150 g/10a	70～150 ℓ/10a	1 回	全面土壌散布	1 回
ねぎ (露地栽培)		植付後～萌芽前 (雑草発生前)				畦間土壌散布	
	一年生 広葉 雑草	定植後 但し、収穫 30 日前まで (雑草発生前)	75～150 g/10a	100ℓ/10a		雑草茎葉散布 又は全面散布	
あさつき	定植 30 日後以降 中耕培土後 但し、収穫 30 日前まで (雑草発生揃期)	全面土壌散布					
にら	一年生 雑草	収穫 30 日前まで (雑草発生前)	100～150 g/10a	70～150 ℓ/10a	1 回	畦間土壌散布	3 回以内 (種球植付後は 1 回以内、 生育期は 2 回以内)
らっきょう		種球植付後 (雑草発生前)	150g/10a			全面土壌散布	
セルリー		生育期 但し、収穫 30 日前まで			100～150 g/10a	1 回	畦間土壌散布
		定植後 但し、定植 7 日後まで (雑草発生前)					
とうき		中耕・培土後 但し、収穫 120 日前まで	100g/10a		2 回 以内		2 回以内
たらのき		中耕・培土後 (雑草発生前)					
食用ゆり わさびだい こん		植付後萌芽前 (雑草発生前～発生始期)	100～150 g/10a		1 回	全面土壌散布	1 回
みつば		は種後出芽前 (雑草発生前)					

作物名	適用 雑草名	使用時期	使用量		本剤 の 使用 回数	使用方法	リニュロン を含む農薬の 総使用回数
			薬量	希釈水量			
はっか	一年生 雑草	収穫 120 日前まで	100g/10a	70～150 ℓ/10a	1 回	全面土壌散布	1 回
おうぎ		は種後出芽前 (雑草発生前)	100～150 g/10a				
ごま			100～200 g/10a	100ℓ/10a			
桑		4～10 月	100～200 g/10a	70～150 ℓ/10a			
そば		は種後出芽前 (雑草発生前)	100g/10a				
えごま (種子)		本葉 5 葉期以降 中耕後 但し、収穫 90 日前まで (雑草発生前)		100ℓ/10a		畦間土壌散布	

