

【適用雑草と使用方法】

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	DCMUを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
だいず	—	一年生雑草	は種後出芽前	70～100 g/10a	70～100 ℓ/10a	1 回	全面土壌散布	2 回以内 （出芽前は 1 回以内、 生育期は 1 回以内）
みかん			雑草生育期 但し、収穫 60 日 前まで	200～400 g/10a	100～200 ℓ/10a		雑草茎葉散布	1 回
パイナップル			植付直後 （雑草発生前）	150～200 g/10a	100 ℓ/10a		全面土壌散布	
さとうきび （春植又は 夏植）			植付後萌芽前 （雑草発生前）	100～150 g/10a		雑草茎葉散布		2 回 以内
さとうきび （株出）		一年生及び 多年生 広葉雑草	雑草生育期 但し、収穫 90 日 前まで				雑草茎葉散布	
		一年生雑草	萌芽前 （雑草発生前）			1 回	全面土壌散布	
飼料用 さとうきび （春植又は 夏植）		一年生及び 多年生 広葉雑草	雑草生育期 但し、収穫 90 日 前まで			2 回 以内	雑草茎葉散布	
		一年生雑草	植付覆土後 （雑草発生前）	1 回		全面土壌散布	1 回	
飼料用 さとうきび （株出）		一年生及び 多年生 広葉雑草	雑草生育期 但し、収穫 90 日 前まで			雑草茎葉散布		
		一年生雑草	萌芽前 （雑草発生前）			全面土壌散布		
		一年生及び 多年生 広葉雑草	雑草生育期 但し、収穫 90 日 前まで		雑草茎葉散布			

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	DCMUを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
水稲 (水田畦畔)	水田 畦畔	一年生雑草	雑草発生前 但し、収穫 30 日 前まで	150～200 g/10a	25～300 ℓ/10a	2 回 以内	全面土壌散布	2 回以内
			雑草発生始期 ～発生揃期 但し、収穫 30 日 前まで		70～100 ℓ/10a		雑草茎葉散布 又は 全面土壌散布	
樹木等	公園 庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 のり面 鉄道等			雑草発生前	200～2000 g/10a	25～200 ℓ/10a	3 回 以内	植栽地を除く 樹木等の 周辺地に 全面土壌散布
		コケ類	コケ類生育期	200～400 g/10a	25～100 ℓ/10a	植栽地を除く 樹木等の 周辺地に 雑草茎葉散布 又は 全面土壌散布		
		イシクラゲ	イシクラゲ 生育期					

