

【適用害虫と使用方法】

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用方法	インドキサルブ を含む農薬の 総使用回数
キャベツ	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ	1000～ 2000 倍	100～300 ℓ/10a	収穫 7 日 前まで	2 回 以内	散布	2 回以内
	ウワバ類 ハイマダラノメイガ シロイチモジヨトウ	10 倍	1～2 ℓ/10a			無人航空機 による散布	
はくさい	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ	1000～ 2000 倍	100～300 ℓ/10a			散布	
	カブラハバチ類 シロイチモジヨトウ ウワバ類	10 倍	1～2 ℓ/10a			無人航空機 による散布	
だいこん	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ	2000 倍	100～300 ℓ/10a	収穫 21 日 前まで		散布	
	カブラハバチ類	20 倍	1～2 ℓ/10a			無人航空機 による散布	
ブロッコリー	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ	2000 倍	100～300 ℓ/10a	収穫 14 日 前まで		散布	
	シロイチモジヨトウ ウワバ類	20 倍	1～2 ℓ/10a			無人航空機 による散布	
ねぎ	シロイチモジヨトウ	1000 倍	100～300 ℓ/10a			散布	
		10 倍	1～2 ℓ/10a			無人航空機 による散布	
いちご	ハスモンヨトウ オオタバコガ	2000 倍	100～300 ℓ/10a	収穫前日 まで		散布	
なす	ハスモンヨトウ オオタバコガ テントウムシダマシ類 タバコノミハムシ						
トマト	ハスモンヨトウ オオタバコガ トマトキバガ						
ピーマン	オオタバコガ						
レタス 非結球レタス	ハスモンヨトウ オオタバコガ ヨトウムシ ウワバ類 シロイチモジヨトウ						
えだまめ	ハスモンヨトウ	2000 倍	100～300 ℓ/10a	収穫 7 日 前まで		散布	
だいず		8～16 倍	800 mℓ/10a			無人航空機 による散布	

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用方法	インドキサカルブ を含む農薬の 総使用回数
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ	2000 倍	100～300 ℓ/10a	収穫 7 日 前まで	2 回 以内	散布	2 回以内
		20 倍	1～2 ℓ/10a			無人航空機 による散布	
さといも	ハスモンヨトウ	2000 倍	100～300 ℓ/10a			散布	
		20 倍	1～2 ℓ/10a			無人航空機 による散布	
しょうが	ハスモンヨトウ アワノメイガ	2000 倍	100～300 ℓ/10a		3 回 以内	散布	3 回以内
		20 倍	1～2 ℓ/10a			無人航空機 による散布	
たばこ	タバコアオムシ ヨトウムシ	2000 倍	100～180 ℓ/10a	収穫 10 日 前まで	1 回	散布	1 回
きく	ハスモンヨトウ オオタバコガ シロイチモジヨトウ	2000 倍	100～300 ℓ/10a	発生初期	4 回 以内	散布	4 回以内
樹木類 (さくらを除く)	ケムシ類	4000 倍	200～700 ℓ/10a	発生初期			
さくら		1000 倍	200～500 ℓ/10a	成虫 発生初期			

