

## 【適用病害・使用目的と使用方法】

作物名	適用病害名	希釀倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラクロストロビンを含む農薬の総使用回数	フルキサビロキサドを含む農薬の総使用回数				
西洋芝 (ベントグラス)	葉腐病(ブラウンパッチ) 赤焼病 ピシウム病 炭疽病 ダラースポット病 紅色雪腐病	100倍	100 mℓ/m <sup>2</sup>	発病前 ～ 発病初期	3回 以内	散布	3回以内	4回以内				
		200倍	200 mℓ/m <sup>2</sup>									
		500倍	500 mℓ/m <sup>2</sup>									
	雪腐小粒菌核病	100倍	100 mℓ/m <sup>2</sup>	根雪前								
		200倍	200 mℓ/m <sup>2</sup>									
		500倍	500 mℓ/m <sup>2</sup>									
	フェアリーリング病	500倍	500 mℓ/m <sup>2</sup>	発病前 ～ 発病初期								
		1000倍	1 ℓ/m <sup>2</sup>									
西洋芝 (バーミューダ グラス)	ピシウム病 ダラースポット病 カーブラリア葉枯病 ネクロティックリングスポット病	100倍	100 mℓ/m <sup>2</sup>									
		200倍	200 mℓ/m <sup>2</sup>									
		500倍	500 mℓ/m <sup>2</sup>									
日本芝	ダラースポット病 カーブラリア葉枯病 葉腐病(ラージパッチ) 炭疽病 立枯病(ゾイシアデクライン) ネクロティックリングスポット病	100倍	100 mℓ/m <sup>2</sup>									
		200倍	200 mℓ/m <sup>2</sup>									
		500倍	500 mℓ/m <sup>2</sup>									

作物名	使用目的	希釀倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラクロストロビンを含む農薬の総使用回数	フルキサビロキサドを含む農薬の総使用回数
西洋芝 (ベントグラス)	根重の増加 芽数の増加	100倍	100 mℓ/m <sup>2</sup>	芝生育期	3回 以内	散布	3回以内	4回以内
		200倍	200 mℓ/m <sup>2</sup>					
		500倍	500 mℓ/m <sup>2</sup>					

