

【適用害虫と使用方法】

| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈 倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の 使用 回数 | 使用方法 | クロナトリコフロール を含む農薬の 総使用回数 |
|---|---|--------------|------------------|----------------|-----------------|------|---|
| キャベツ | コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ ネキリムシ類 カブラノバチ類 | 100倍 | ※1 | 育苗期後半 ～定植当日 | 1回 | 灌注 | 4回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 定植後の処理 は3回以内) |
| | コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ ウワバ類 | 500倍 | 苗地床 1㎡当り2ℓ | | | | |
| | コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ ウワバ類 オオタバコガ | 2000倍 | 100～300 ℓ/10a | 収穫前日 まで | 3回 以内 | 散布 | |
| | 20倍 | 1～2 ℓ/10a | 無人航空機 による散布 | | | | |
| はくさい | コナガ アオムシ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ カブラノバチ類 | 100倍 | ※1 | 育苗期後半 ～定植当日 | 1回 | 灌注 | |
| | コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ カブラノバチ類 オオタバコガ | 2000倍 | 100～300 ℓ/10a | | | | |
| | | 20倍 | 1～2 ℓ/10a | 無人航空機 による散布 | | | |
| かぶ | コナガ | | | | | | 3回以内 |
| 非結球あぶらな科 葉菜類(タアサイ、 非結球はくさい、 なばな類を除く) | コナガ ハモグリバエ類 | 2000倍 | 100～300 ℓ/10a | | 2回 以内 | 散布 | 2回以内 |
| タアサイ | オオタバコガ | 100倍 | ※1 | 育苗期後半 ～定植当日 | 1回 | 灌注 | 3回以内 (灌注は1回以内、 散布は2回以内) |
| 非結球はくさい | ハスモンヨトウ | | | | | | |
| | コナガ ハモグリバエ類 | 2000倍 | 100～300 ℓ/10a | 収穫前日 まで | 2回 以内 | 散布 | |
| なばな類 | アオムシ ハスモンヨトウ コナガ ハモグリバエ類 | 20倍 | 1～2ℓ/10a | | | | 3回 以内 |
| | | アオムシ | 100倍 | ※1 | 育苗期後半 ～定植当日 | 1回 | |
| アマランサス (茎葉) | シロオビノメイガ | 2000倍 | 100～300 ℓ/10a | 収穫前日 まで | 3回 以内 | 散布 | 3回以内 |

※1: セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5～4ℓ)当り0.5ℓ

| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈 倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の 使用 回数 | 使用方法 | クロントラコリフロール を含む農薬の 総使用回数 |
|---|---|---------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|---|
| だいこん | コナガ アオムシ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ カブラノバチ類 ハモグリバエ類 | 2000倍 | 100~300 ℓ/10a | 収穫前日 まで | 3回 以内 | 散布 | 3回以内 |
| | | 20倍 | 1~2 ℓ/10a | | | 無人航空機 による散布 | |
| はつかだいこん | キアゲハ ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100~300 ℓ/10a | | 1回 | 散布 | 1回 |
| にんじん | | 20倍 | 1~2 ℓ/10a | | 2回 以内 | 無人航空機 による散布 | 2回以内 |
| てんさい | ヨトウムシ シロオビノメイガ | 4000~ 5000倍 | 100~300 ℓ/10a | | | 無人航空機 による散布 | |
| | | 1000~ 1250倍 | 25ℓ/10a | | | | |
| | | 40~50 倍 | 1~2ℓ/10a | | | | |
| カリフラワー | コナガ アオムシ ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100~300 ℓ/10a | 育苗期後半 ~定植当日 | 3回 以内 | 散布 | 4回以内 (灌注は1回以内、 散布は3回以内) |
| | | 100倍 | ※1 | | 1回 | 灌注 | |
| ブロッコリー | コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ オオタバコガ | 2000倍 | 100~300 ℓ/10a | 収穫前日 まで | 3回 以内 | 散布 | 4回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 定植後の処理は 3回以内) |
| | | 20倍 | 1~2 ℓ/10a | | | 無人航空機 による散布 | |
| 茎ブロッコリー | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100~300 ℓ/10a | 育苗期後半 ~定植当日 | 1回 | 散布 | 4回以内 (灌注は1回以内、 散布は3回以内) |
| | | 100倍 | ※1 | | | 灌注 | |
| レタス | ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ | 2000倍 | 100~300 ℓ/10a | 収穫前日 まで | 3回 以内 | 散布 | 4回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 定植後の処理は 3回以内) |
| | | 20倍 | 1~2 ℓ/10a | | | 無人航空機 による散布 | |
| | ハモグリバエ類 | 1000~ 2000倍 | 100~300 ℓ/10a | | | 散布 | |
| ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ ハモグリバエ類 ネキリムシ類 ヒメフタテンヨコバイ | | | | 100倍 | ※1 | 育苗期後半 ~定植当日 | |
| | 非結球レタス | ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ ハモグリバエ類 | 2000倍 | | | | |
| 20倍 | | | 1~2 ℓ/10a | 無人航空機 による散布 | | | |

※1: セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4ℓ)当り0.5ℓ

| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈 倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の 使用 回数 | 使用方法 | クロントラコリフロール を含む農薬の 総使用回数 | |
|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|------|---|-------------------------------|
| トマト | ハモグリバエ類 | 1000～ 2000倍 | 100～300 ℓ/10a | 収穫前日 まで | 3回 以内 | 散布 | 4回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 散布は3回以内) | |
| | オオタバコガ トマトキバガ | 2000倍 | | | | | | |
| | トマトキバガ | 100 倍 | 1株当り 25ml | 育苗期後半 ～定植当日 | 1 回 | 灌注 | | |
| | ハモグリバエ類 コナジラミ類 | 200 倍 | 1株当り 50ml | | | | | |
| ミニトマト | トマトキバガ | 100 倍 | 1株当り 25ml | 収穫前日 まで | 3回 以内 | 散布 | 4回以内 (灌注は1回以内、 散布は3回以内) | |
| | ハモグリバエ類 コナジラミ類 | 200 倍 | 1株当り 50ml | | | | | |
| | ハモグリバエ類 オオタバコガ トマトキバガ | 2000倍 | 100～300 ℓ/10a | | | | | |
| なす | ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 ネキリムシ類 | 100倍 | 1株当り 25ml | 育苗期後半 ～定植当日 | 1回 | 灌注 | 3回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 散布は2回以内) | |
| | ハモグリバエ類 | 200倍 | 1株当り 50ml | | | | | |
| | ハスモンヨトウ オオタバコガ | 2000倍 | 100～300 ℓ/10a | 収穫前日 まで | 2回 以内 | 散布 | | |
| とうがらし類 | ハスモンヨトウ オオタバコガ | 1000～ 2000倍 | 1株当り 25ml | 育苗期後半 ～定植当日 | 1回 | | 灌注 | 4回以内 (灌注は1回以内、 散布は3回以内) |
| | ハスモンヨトウ コナジラミ類 | 100倍 | | | | | | |
| ピーマン | ハスモンヨトウ オオタバコガ | 1000～ 2000倍 | 100～300 ℓ/10a | 収穫前日 まで | 2回 以内 | 散布 | 3回以内 (灌注は1回以内、 散布は2回以内) | |
| | ハスモンヨトウ コナジラミ類 | 100倍 | 1株当り 25ml | 育苗期後半 ～定植当日 | 1回 | | | 灌注 |
| きゅうり | ハモグリバエ類 | 100～ 200倍 | 1株当り 50ml | 育苗期後半 ～定植当日 | 1回 | 灌注 | 4回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 散布は3回以内) | |
| | | 200倍 | | | | | | |
| | | 1000～ 2000倍 | 100～300 ℓ/10a | 収穫前日 まで | 2回 以内 | 散布 | | |
| | ウリノメイガ | 2000倍 | | | | | | |
| ズッキーニ | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 100～300 ℓ/10a | 収穫前日 まで | 3回 以内 | 散布 | 3回以内 | |
| メロン すいか | オオタバコガ ハモグリバエ類 | 2000倍 | | | | | | |
| とうが ん にがう り | ハスモンヨトウ | | | | | | | 2回 以内 |
| いちご | ヨトウムシ | ※2 | | | 1回 | 1回 | | 2回以内 (灌注は1回以内、 散布は1回以内) |
| せり科葉菜類 (パセリを除く) | ヨトウムシ | ※2 | | | 1回 | 1回 | | 2回以内 (灌注は1回以内、 散布は1回以内) |
| パセリ | ヨトウムシ ハスモンヨトウ | ※2 | | | 1回 | 1回 | | 2回以内 (灌注は1回以内、 散布は1回以内) |

※2: 収穫7日前まで但し、みつばの伏せ込み栽培は伏せ込み前まで

| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈 倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の 使用 回数 | 使用方法 | クロントラコリプロール を含む農薬の 総使用回数 |
|---|--|----------------|------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------------------|
| らっきょう | ハモグリバエ類 | 2000倍 | 100~300 ℓ/10a | 収穫3日前 まで | 3回 以内 | 散布 | 3回以内 |
| ねぎ | シロイチモジヨトウ ネギコガ ハモグリバエ類 | | 20倍 | | | 1~2 ℓ/10a | 育苗期後半 ~定植当日 |
| | ハモグリバエ類 | 100倍 | ※1 | 灌注 | | | |
| 豆類 (種実、ただし、 だいず、あずき、 らっかせいを除く) | ハスモンヨトウ | 4000倍 | 100~300 ℓ/10a | 収穫7日前 まで | 2回 以内 | 散布 | 2回以内 |
| だいず | ハスモンヨトウ マメシンクイガ ウコンノメイガ オオタバコガ | | 16~32 倍 | | | 0.8ℓ/10a | |
| あずき | ハスモンヨトウ アズキノメイガ | 4000倍 | 100~300 ℓ/10a | 収穫3日前 まで | 3回 以内 | 散布 | 3回以内 |
| えだまめ | ハスモンヨトウ マメシンクイガ ウコンノメイガ オオタバコガ | | 16~32 倍 | | | 0.8ℓ/10a | |
| 未成熟ささげ | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100~300 ℓ/10a | 収穫前日 まで | 3回 以内 | 散布 | 3回以内 |
| 未成熟そらまめ | ハモグリバエ類 | 1000~ 2000倍 | | | | | |
| さやいんげん 実えんどう さやえんどう | ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 | 2000倍 | 100~300 ℓ/10a | 収穫前日 まで | 3回 以内 | 散布 | 3回以内 |
| やまのいも | ハスモンヨトウ ナガイモコガ | | 20倍 | | | 1~2 ℓ/10a | |
| かんしょ | ハスモンヨトウ ナカジロシタバ アリモドキゾウムシ ヒルガオハモグリガ イモゾウムシ | 2000~ 4000倍 | 100~300 ℓ/10a | 収穫前日 まで | 3回 以内 | 散布 | 3回以内 |
| | | 16倍 | 0.8~1.6 ℓ/10a | | | 無人航空機 による散布 | |
| さといも | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100~300 ℓ/10a | 収穫前日 まで | 3回 以内 | 散布 | 3回以内 |
| | | 20倍 | 1~2 ℓ/10a | | | 無人航空機 による散布 | |
| アスパラガス | ハスモンヨトウ シロオビノメイガ | 2000倍 | 100~300 ℓ/10a | 収穫3日前 まで | 2回 以内 | 散布 | 2回以内 |
| ほうれんそう | ハスモンヨトウ | | | | | | |
| モロヘイヤ エンサイ | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100~300 ℓ/10a | 収穫3日前 まで | 3回 以内 | 散布 | 3回以内 |
| つるむらさき しそ科葉菜類 (えごま(葉)を除く) | | | | | | | |
| えごま(葉) ふき | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100~300 ℓ/10a | 収穫120日 前まで | 2回 以内 | 散布 | 2回以内 |
| ふき(ふきのとう) | | | | | | | |

※1:セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4ℓ)当り0.5ℓ

| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈 倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の 使用 回数 | 使用方法 | クロントラコリプロール を含む農薬の 総使用回数 |
|----------------|-------------------------------|----------------|------------------|--------------|-----------------|----------------|--|
| クレソン (土耕栽培) | コナガ | 2000倍 | 100~300 ℓ/10a | 収穫3日前 まで | 3回 以内 | 散布 | 3回以内 |
| ごま | オオタバコガ | | | 収穫14日前 まで | 2回 以内 | | 2回以内 |
| はとむぎ | アワノメイガ | | | | | | |
| 飼料用とうもろこし | アワノメイガ ツマジロクサヨトウ | 2000~ 4000倍 | 1~2 ℓ/10a | 収穫前日 まで | 3回 以内 | 無人航空機 による散布 | 4回以内 (は種前の塗沫 処理は1回以内、 は種後は3回以内) |
| | アワノメイガ ツマジロクサヨトウ オオタバコガ | 16倍 | 1.6ℓ/10a | | | 散布 | |
| | オオタバコガ | 2000倍 | 100~300 ℓ/10a | | | 無人航空機 による散布 | |
| | | 20倍 | 1~2 ℓ/10a | | | 散布 | |
| とうもろこし | アワノメイガ オオタバコガ ツマジロクサヨトウ | 2000倍 | 100~300 ℓ/10a | 3回 以内 | 無人航空機 による散布 | 散布 | |
| | | 20倍 | 1~2 ℓ/10a | | | | |
| | | 16倍 | 1.6ℓ/10a | | | | |
| オクラ | オオタバコガ ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100~300 ℓ/10a | 3回 以内 | 無人航空機 による散布 | 散布 | |
| | | 20倍 | 1~2 ℓ/10a | | | | |
| しょうが | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100~300 ℓ/10a | 3回 以内 | 無人航空機 による散布 | 散布 | |
| | | 20倍 | 1~2 ℓ/10a | | | | |
| たばこ | ヨトウムシ | 2000倍 | 100~180 ℓ/10a | 収穫10日前 まで | 2回 以内 | 散布 | 2回以内 |
| とうき | キアゲハ | | 100~300 ℓ/10a | 発生初期 | 4回 以内 | | 4回以内 |

