

ロングセラーに納得! 浸透力が効果安定のカギ!

機能性展着剤

アプローチ **BI** ビーアイ


アプローチBIの浸透性の秘密は、
優れた「可溶化能」!

可溶化とは…

白濁した農薬希釈液に
アプローチBIを一定濃
度以上入れると、透明に
なります。これは農薬粒
子が目に見えないほど
細くなった状態です。
この現象を「可溶化」と
言います。



左から、乳剤希釈液 ▶ アプローチBI添加直後 ▶ しばらく静置した後



可溶化によって

細くなった農薬粒子は、植物表面のクチクラ膜の
亀裂を通過することができるようになります。
そのため植物体内にスムーズに浸透していき農薬
の効果を安定させます。

浸透力の効果!!


ジベレリンへの加用効果

アプローチBIの浸透力はきわめて短時間で発揮されます。ブドウに対するジベレリン加用試験では、処理数時間後の降雨でも対照区とほぼ同じ無核果率が得られています。

処理内容 ジベレリン100ppm+アプローチBI 500倍


供試品目 デラウエア

試験場所 長野県農業試験場(昭和48年度)



ねぎのさび病に対する試験

供試品目	ねぎ
試験について	昭和57年度 鳥取県野菜試験場西伯分場報告より算出
試験場所	境港市渡町大沢
耕種概要	は種:4月2日/定植:7月16日
散布	10月1日から12月10日の間に7日間隙で計10回散布。
調査	12月20日。各区中央部25株の第3.4葉の中央部片面10cm間の夏孢子堆数を調査。



適用農薬・作物および使用方法

適用農薬名	適用作物名	散布液10ℓ当り使用量*	使用方法
メピコートクロリド、ジベレリン	ぶどう	10~50mℓ	添加
殺虫剤、殺菌剤	稲、麦類、果樹類、野菜類、花き類、茶、芝等	10mℓ	
	野菜類、イモ類、豆類	5mℓ	
ジクワット、パラコート、DCMU、ターバシル、プロマシル等の非選択性除草剤	非選択性除草剤の登録内容の作物	10~20mℓ	

*希釈倍数 5mℓ:2000倍 10mℓ:1000倍 20mℓ:500倍 50mℓ:200倍

効果・薬害の注意(抜粋)

- 本剤を添加する適用農薬の使用方法を厳守するとともに、次のことに留意してください。
 - ・適用農薬の使用上の注意事項に、薬害の生じやすい作物、気象条件などが記載されている場合には、本剤の使用をさけてください。
 - ・作物の幼苗期、高温期など一般に薬害の生じやすい条件では、本剤の使用をさけてください。
 - ジチアノン水和剤には薬害を生じるおそれがあるので本剤を添加しないでください。
 - 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合、使用者の責任において事前に薬害有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所など関係機関の指導を受けることをおすすめします。
- 〈使用上のポイント〉
- キノキサリン系、ストロビルリン系、アニリド系薬剤に添加すると薬害を生じるおそれがあるので十分注意し、使用に当たっては事前にその適否を確認してください。病害虫防除所等関係機関の指導がある場合にはそれに従ってください。
 - 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

●ラベルをよく読んでください。●記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。

製造

kaO 花王株式会社

販売

MBC 丸和バイオケミカル株式会社

■本 社/〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-19-23
TEL 03-5296-2314
■札 幌/TEL 011-222-1285 ■仙 台/TEL 022-261-1103
■名古屋/TEL 052-951-7234 ■大 阪/TEL 06-6484-6850
■福 岡/TEL 092-714-7101 <https://www.mbc-g.co.jp>
お問い合わせ窓口/ TEL 03-5962-9731 (9時~17時 土日祝を除く)