

殺虫剤の頼れるパートナー！ 高い濡れ性と付着性！

機能性展着剤

スカッシュ

- ・微小害虫を包み込み、殺虫剤の効果を安定させます。
- ・濡れ性が良く、乾きが早いため薬液の汚れが軽減されます。
- ・少泡性に優れています。

ダニへの付着効果



水



スカッシュ加用

汚れの軽減効果




水和剤単独



スカッシュ加用



ナミハダニに対する スカッシュ加用試験



栃木県内採取個体の
散布5日後の死虫率
(自社試験、2005年)

- 試験場所
丸和バイオケミカル(株)
阿見開発センター
- 試験方法
各ダニ剤に展着剤を加
用し、薬剤処理5日後
に死虫率を求めた

■ 適用農薬・作物および使用方法

適用農薬名	作物名	散布液10ℓ当り使用量※	使用方法
殺虫剤 ・ 殺菌剤	稲、麦類、雑穀類、野菜類、いも類 豆類(種実)、果樹類 花き類・観葉植物、てんさい	5～10mℓ	添 加
	茶	10mℓ	
ジベレリン剤	温州みかん		

※希釈倍数 5mℓ:2000倍 10mℓ:1000倍

■ 効果・薬害の注意(抜粋)

- 本剤を添加する適用農薬の使用方法を厳守するとともに、次のことに留意してください。
 - ・適用農薬の使用上の注意事項に、薬害の生じやすい作物、気象条件などが記載されている場合には、本剤の使用をさせていただきます。
 - ・作物の幼苗期、高温期など一般に薬害の生じやすい条件では、本剤の使用をさせていただきます。

■ 使用上のポイント

- キノン系、キノキサリン系、ストロビルリン系、アニリド系薬剤に添加すると薬害を生じるおそれがあるので十分注意し、使用に当たっては事前にその適否を確認してください。病虫害防除所等関係機関の指導がある場合にはそれに従ってください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

※保管上の注意

本剤は低温(10℃以下)で放置された場合、一部白濁沈殿を生じる場合がありますので、使用の際にはあらかじめ透明液体にもどしてから(10℃以上においておくか、温湯を用いて溶かす)使用してください。なお、一部白濁沈殿が生じた場合でも本剤の品質には問題はありません。

●ラベルをよく読んでください。●記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。

■ 製造

KaO 花王株式会社

■ 販売

MBC 丸和バイオケミカル株式会社

■本 社／〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-19-23
TEL 03-5296-2314
■札 幌／TEL 011-222-1285 ■仙 台／TEL 022-261-1103
■名古屋／TEL 052-951-7234 ■大 阪／TEL 06-6484-6850
■福 岡／TEL 092-714-7101

<https://www.mbc-g.co.jp>

お問い合わせ窓口／TEL 03-5962-9731 (9時～17時 土日祝を除く)