殺菌剤

パレード®20フロアブル

農林水産省登録 第 24071 号

2026 年 10 月 21 日現在

【適用病害と使用方法】

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラジフルミドを含む農薬の総使用回数
豆類(種実、ただし、らっかせいを除く) 豆類(未成熟)	菌核病 灰色かび病 うどんこ病 (だいず、さやえんどう) 褐紋病(さやえんどう)	2000～4000 倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	3 回以内
	褐色輪紋病 (だいず) さび病(あずき、さやえんどう)	2000 倍					
トマト ミニトマト	灰色かび病 葉かび病 うどんこ病 菌核病 斑点病	2000～4000 倍					
	すすかび病	2000 倍					
なす	灰色かび病 すすかび病 菌核病 うどんこ病 黒枯病	2000～4000 倍					
ピーマン及びとうがらし類	うどんこ病 黒枯病 灰色かび病						
きゅうり	灰色かび病 菌核病 うどんこ病 褐斑病 つる枯病						
ズッキーニ	灰色かび病 菌核病 うどんこ病 つる枯病						
にがうり	うどんこ病						
うり類(成熟)	うどんこ病 つる枯病 (すいか、メロン) 菌核病 (すいか、メロン)						
	うどんこ病	16 倍	1.6ℓ/10a			無人航空機による散布	
		20 倍	2.0ℓ/10a				
		32 倍	3.2ℓ/10a				

®は日本農薬(株)の登録商標

ご使用の際は必ず製品ラベルをご確認ください

殺菌剤

パレード®20フロアブル

農林水産省登録 第 24071 号

2026 年 10 月 21 日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラジフルミドを含む農薬の総使用回数
はくさい	黒斑病 白斑病 菌核病	2000～4000 倍	100～300 ℓ/10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	3 回以内（灌注は 1 回以内）
	菌核病	16 倍	1.6ℓ/10a			無人航空機による散布	
		20 倍	2.0ℓ/10a				
		32 倍	3.2ℓ/10a				
	苗立枯病 （リゾクトニア菌） 菌核病	100 倍	※	育苗期後半～定植当日	1 回	灌注	
キャベツ	菌核病 株腐病 根朽病	2000～4000 倍	100～300 ℓ/10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	
	菌核病	16 倍	1.6ℓ/10a			無人航空機による散布	
		20 倍	2.0ℓ/10a				
		32 倍	3.2ℓ/10a				
	菌核病 苗立枯病 （リゾクトニア菌） 根朽病	100 倍	※	育苗期後半～定植当日	1 回	灌注	
はなやさい類	菌核病 黒すす病 根朽病	2000～4000 倍	100～300 ℓ/10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	
	菌核病 黒すす病	16 倍	1.6ℓ/10a			無人航空機による散布	
		20 倍	2.0ℓ/10a				
		32 倍	3.2ℓ/10a				
	菌核病 黒すす病 根朽病 苗立枯病 （リゾクトニア菌）	100 倍	※	育苗期後半～定植当日	1 回	灌注	
なばな類	菌核病	2000 倍	100～300 ℓ/10a	収穫前日まで	2 回以内	散布	3 回以内（灌注は 1 回以内、散布は 2 回以内）
		100 倍	※	定植当日	1 回	灌注	
レタス 非結球レタス	菌核病 灰色かび病 すそ枯病	2000～4000 倍	100～300 ℓ/10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	3 回以内（灌注は 1 回以内）
	白絹病	2000 倍					
	菌核病 すそ枯病 白絹病	100 倍	※	育苗期後半～定植当日	1 回	灌注	
	菌核病 灰色かび病	16 倍	1.6ℓ/10a	収穫前日まで	3 回以内	無人航空機による散布	
		20 倍	2.0ℓ/10a				
		32 倍	3.2ℓ/10a				
にんじん	黒葉枯病 菌核病	2000～4000 倍	100～300 ℓ/10a			散布	3 回以内

※：セル成型育苗トレイ 1 箱または、ペーパーポット 1 冊（約 30×60cm、使用土壌約 1.5～4ℓ）当り 0.5ℓ

®は日本農薬(株)の登録商標

ご使用の際は必ず製品ラベルをご確認ください

殺菌剤

パレード®20フロアブル

農林水産省登録 第 24071 号

2026 年 10 月 21 日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラジフルミドを含む農薬の総使用回数
たまねぎ	黒腐菌核病	2000 倍	100～300 ℓ/10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	3 回以内
	灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病	2000～4000 倍					
		20 倍	1.6ℓ/10a			無人航空機による散布	
		25 倍	2.0ℓ/10a				
		40 倍	3.2ℓ/10a				
にんにく	黒腐菌核病	原液	種球重量の 1%	植付前	1 回	種球塗沫	3 回以内（種球塗沫は 1 回以内、散布は 2 回以内）
	葉枯病	2000 倍	100～300 ℓ/10a	収穫前日まで	2 回以内	散布	
にら	白斑葉枯病	2000～4000 倍			3 回以内		3 回以内
	白絹病 褐色葉枯病	2000 倍					
ねぎ	黒腐菌核病	100 倍	※	育苗期後半～定植当日	1 回	灌注	3 回以内（灌注及び浸漬は合計 1 回以内）
		25～50 倍	―	定植直前		5～10 分間苗根部浸漬	
	黒斑病 葉枯病 小菌核腐敗病 小菌核病	2000～4000 倍	100～300 ℓ/10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	
	さび病 黒腐菌核病 白絹病	2000 倍					
	黒斑病 葉枯病 さび病	20 倍	1.6ℓ/10a			無人航空機による散布	
		25 倍	2.0ℓ/10a				
		40 倍	3.2ℓ/10a				
いちご	うどんこ病 灰色かび病	2000～4000 倍	100～300 ℓ/10a			散布	3 回以内
アスパラガス	茎枯病 斑点病 褐斑病	2000 倍	100～700 ℓ/10a				
		8 倍	1.6ℓ/10a			無人航空機による散布	
		10 倍	2.0ℓ/10a				
		16 倍	3.2ℓ/10a				
オクラ	うどんこ病	2000 倍	100～300 ℓ/10a			散布	
しょうが	白星病	2000～4000 倍					

※：セル成型育苗トレイ 1 箱または、ペーパーポット 1 冊（約 30×60cm、使用土壌約 1.5～4ℓ）当り 0.5ℓ

®は日本農薬(株)の登録商標

ご使用の際は必ず製品ラベルをご確認ください

殺菌剤

パレード®20フロアブル

農林水産省登録　第 24071 号

2026 年 10 月 21 日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラジフルミドを含む農薬の総使用回数
花き類・観葉植物（ばら、きく、りんどう、ゆり、トルコギキョウを除く）	うどんこ病	2000～4000 倍	100～300 ℓ/10a	発病初期	3 回以内	散布	3 回以内
ばら	うどんこ病 黒星病	4000 倍					
きく	白さび病 うどんこ病	2000～4000 倍					
	褐斑病	2000 倍					
りんどう	黒斑病 花腐菌核病	2000 倍					
	褐斑病 葉枯病			発病前			
	うどんこ病	2000～4000 倍		発病初期			
ゆり	葉枯病	2000 倍					
トルコギキョウ	うどんこ病 斑点病	2000～4000 倍					

®は日本農薬(株)の登録商標
ご使用の際は必ず製品ラベルをご確認ください