新登場!!

農林水産省登録 第24768号

てんさい用除草剤

レナックス®水和剤

®は丸和バイオケミカルの登録商標です。

除草剤分類 5,5

てんさいの
直播栽培も移植栽培も
実績の2成分のかけ合わせで支えます

有効成分：メタミトロン 35.0%　レナシル 40.0%　人畜毒性：普通物 ※毒劇物に該当しないものを指していう通称

レナックス水和剤の特長

1 幅広い効果

2つの有効成分により幅広い雑草に対して高い効果

2 てんさいへの高い安全性

てんさいに対して薬害の心配が少ない

3 直播てんさい、移植てんさい両方で使用可能

最新の登録内容はこちらから

MBC 丸和バイオケミカル株式会社

使用上のポイント

◆150～200g/10a処理で十分な除草効果が確認されております。
◆雑草の発生状況に応じて既存の茎葉処理剤と組み合わせてご使用ください。

試験成績 直播 てんさい

試験場所 ▶ 植調十勝試験地
試験年次 ▶ 2021年度
品　　種 ▶ カーベ2K314
播 種 日 ▶ 2021年4月27日
土質土性 ▶ 褐色火山性･埴壌土
処 理 日 ▶ 2021年5月23日
処理方法 ▶ 炭酸ガス加圧式噴霧器（散布ノズル:TeeJet8002VS）
展 着 剤 ▶ サーファクタントWK×1000倍
調 査 日 ▶ 2021年6月21日（処理29日後調査）
処理時の作物 ▶ てんさい:2葉、2cm
処理時の雑草 ▶ スズメノカタビラ:1葉、1cm
イヌビエ:1葉、1cm
シロザ:1対、1cm
ハコベ:1対、1cm
タニソバ:子葉、0.5cm

▼ 雑草調査



適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	メタミトロンを含む農薬の総使用回数	レナシルを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量				
てんさい（移植栽培）	一年生雑草	移植後（雑草発生始期）但し、収穫60日前まで	150～300g/10a	50～100ℓ/10a	2回以内	雑草茎葉散布又は全面散布	5回以内	2回以内
		中耕後（雑草発生始期）但し、収穫60日前まで						
てんさい（直播栽培）		本葉2葉期以降（雑草発生始期）但し、収穫60日前まで						

効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 本剤使用の際は、展着剤（非イオン系）を加用してください。
- 薬液は十分かきまぜ、また時々撹拌しながら散布してください。
- 砂地で水はけのよい畑では使用をさけてください。
- 生育しすぎた雑草には効果が劣るので、雑草発生始期（草丈3cm以下）に散布してください。
- イヌビエ、ツユクサには効果が劣るので、これらの発生の多い畑では使用をさけてください。
- 散布むらのないように均一に散布してください。
- 本剤は残効性が長く、後作物に対して影響を及ぼすことがあるので注意してください。特に、イネ科、マメ科、ウリ科、ナス科及びアブラナ科作物等では影響が認められているので、本剤処理後6ヶ月以内にこれらを後作物として栽培しないでください。
- 使用後、容器や散布器具は必ず十分水で洗ってください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

●ラベルをよく読んでください　●記載以外には使用しないでください　●小児の届く所には置かないでください

本資料の記載内容は2025年11月現在の登録内容に基づいています。

■お求めは…

■製造・販売

MBC 丸和バイオケミカル株式会社

■本　社／〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-19-23 TEL 03-5296-2314
■札　幌／TEL 011-222-1285　■仙　台／TEL 022-261-1103
■名古屋／TEL 052-951-7234　■大　阪／TEL 06-6484-6850
■福　岡／TEL 092-714-7101
https://www.mbc-g.co.jp
お問い合わせ窓口／TEL 03-5962-9731（9時～17時 土日祝を除く）