

【適用雑草と使用方法】

| 作物名            | 適用<br>雑草名 | 使用時期                                   | 使用量              |                 | 本剤<br>の<br>使用<br>回数 | 使用方法             | メタトロンを<br>含む農薬の<br>総使用回数 | レナシルを<br>含む農薬の<br>総使用回数                  |
|----------------|-----------|----------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------------|
|                |           |                                        | 薬量               | 希釈水量            |                     |                  |                          |                                          |
| てんさい<br>(移植栽培) | 一年生<br>雑草 | 移植後(雑草発生始期)<br>但し、収穫 60 日前まで           | 150～300<br>g/10a | 50～100<br>ℓ/10a | 2 回<br>以内           | 雑草茎葉散布<br>又は全面散布 | 5 回以内                    | 3 回以内<br>(定植後又<br>は出芽後<br>の処理は 2<br>回以内) |
|                |           | 中耕後(雑草発生始期)<br>但し、収穫 60 日前まで           |                  |                 |                     |                  |                          |                                          |
| てんさい<br>(直播栽培) |           | 本葉 2 葉期以降<br>(雑草発生始期)<br>但し、収穫 60 日前まで |                  |                 |                     |                  |                          |                                          |

